

Biotopname														TK10							Biotop-Nr.																		
Borstgrasrasen am Eichort						X								0207 - 333							4003																		
Standort /Geologie														Anschluß in TK																									
Anmoor, Küstenüberflutungsmoor, Boddenküste																																							
Naturraum						Fischland-Darß-Zingst und südliches Boddenkettenland						Luftbild-Nr.							Film-Nr.							Bild-Nr.													
120																			180							0512													
Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt						Größe in ha																											
Nordvorpommern						Fuhlendorf													Länge in m														2100						
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis												min. Breite in m																											
00300												max. Breite in m																											
Schutzmerkmale						geschützt nach §20 LNatG M-V X						1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil						NLP 1 FND NP FIB							NSG LSG BR FFH-Geb. 1							ND GLB FnB Wald-Totalreservat							
Hauptcod.						Nebencode												Überlagerungscode																					
Code						T B B												U M K																					
%						1 0 0																																	
Vegetationseinheiten																																							
Pfeifengras-Borstgrasrasen																																							
Habitate + Strukturen																																							
Beschreibung / Besonderheiten																																							
- kleine Fläche am Eichort mit Pfeifengras-Borstgrasrasen auf anmoorigem, mesotrophem Standort im Übergangsbereich von der Salzwiese (Küstenüberflutungsmoor) zur angrenzenden Frischwiese (leichte Erhöhung)																																							
- Beweidung durch Rinder																																							
- nach Süden grenzt Brackwasser-Schilfröhricht des Boddenufers an																																							
- Vorkommen von Rote-Liste-Arten, z.B. Teufelsabbiss, Färberscharte, Blutwurz, Prachtnelke, Borstgras																																							
LRT 6230: guter Erhaltungszustand																																							
Wertbestimmende Kriterien																																							
														vielfältige Standortverhältnisse																									
														historische Nutzungsformen																									
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand														aktuelle Nutzung																									
X seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft														Flächengröße / Länge																									
														Umgebung relativ störungsarm																									
														landschaftsprägender Charakter																									
														Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																									
Gefährdung																																							
keine Gefährdung X																																							
Empfehlung																																							

[illegible]

Nutzungsintensität		
k	g	
		intensiv
	g	extensiv
		aufgelassen
		keine Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Nutzungsart		
k	g	
		Acker
		Wiese
	g	Weide
		forstliche Nutzung

Umgebung		
k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland. intensiv
	g	Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
	g	Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant <i>Festuca rubra</i>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
--	---

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Molinia caerulea	Leontodon autumnalis	<u>Nardus stricta</u>	Trifolium pratense
<u>Carex flacca</u>	Ononis spinosa	Rumex acetosa	<u>Potentilla erecta</u>
Juncus effusus	Hypochoeris radicata	Agrostis stolonifera	<u>Lotus tenuis</u>

Pflanzenarten vereinzelt	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
<u>Dianthus superbus</u>	<u>Centaurea jacea</u>	<u>Succisa pratensis</u>	<u>Serratula tinctoria</u>
Ranunculus acris	<u>Hydrocotyle vulgaris</u>	Plantago lanceolata	Deschampsia cespitosa

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 11.08.2007	
	Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: Grünspektrum-Fischer	Foto: 1	Folgeseiten: 0