Biotopname
Naßwiese nordöstlich von Strüssendorf

		X			

TK10 0208 - 424 - **Biotop-Nr.** 4025

Anschluß in TK
-
-
-

Standort /Geologie
Moor- und Anmoorbildungen

Naturraum 122 Nord- und ostrügensches Hügel- und Boddenland

	Film-Nr.		**Bild-Nr.**
Luftbild-Nr.	156	-	0187
		-	
Größe in ha	0	,	3854
Länge in m		,	
min. Breite in m		,	
max. Breite in m		,	

Landkreis / Kreisfreie Stadt
Rügen

Gemeinde / Stadt
Buschvitz

lfd. Nr. im Biotopverzeichnis
03137

Schutzmerkmale
geschützt nach §20 LNatG M-V ☒

1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil

NLP	☐	FND	☐	NP	☐	FiB	☐
NSG	☐	LSG	☐	BR	☐	FFH-Geb.	☐
ND	☐	GLB	☐	FnB	☐	Wald-Totalreservat	☐

	Hauptcod.	**Nebencode**								**Überlagerungscode**	
Code	GFR	GFD									
%	80	20									

Vegetationseinheiten
Sumpfseggen-Kohldistel-Feuchtwiese, Waldsimsen-Quellwiese, Kriechhahnenfuß-Rohrglanzgras-Grasland

Habitate + Strukturen

Beschreibung / Besonderheiten
Schmaler Nord-Süd verlaufender Naßwiesenbereich, innerhalb eines ausgedehnten Grünlandkomplexes, nordöstlich von Strüssendorf auf Niedermoorstandort.
Krautschicht besteht im nördlichen Bereich vorwiegend aus Sumpf-Segge mit eingestreuten Kohldistel, im südlichen Bereich vermehrt sich auffällig die Wald-Simse. Überall eingestreut findet sich Wiesen-Segge (R.L.3), Flatter-Binse, Kriechender Hahnenfuß, Rohr-Glanzgras, Wolliges Honiggras u.a.
Vereinzelt wachsen Sumpf-Schafgarbe (R.L.3), Glieder-Binse und Mädesüß.
Weitere Rote-Liste-Arten sind: Wiesen-Knöterich (R.L.2), Brennender Hahnenfuß (R.L.3) und Kuckucks-Lichtnelke (R.L.2)
Gefährdet durch Entwässerung.

Wertbestimmende Kriterien

☐	Artenreichtum (Flora)	☐	vielfältige Standortverhältnisse
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☐	historische Nutzungsformen
☐	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐	aktuelle Nutzung
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	☐	Flächengröße / Länge
☐	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐	Umgebung relativ störungsarm
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐	landschaftsprägender Charakter
☐	typische Zonierung von Biotoptypen	☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion
☐	Struktur- und Habitatreichtum	☐	

Gefährdung

YWS YWG

keine Gefährdung ☐

Empfehlung

ZSE

STANDORTMERKMALE

(k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10 0208 - 424 - **Biotop-Nr.** 4025

Substrat

k	g	
		Torf, wenig gestört
	g	Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamr
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
k		mesotroph
	g	eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
	g	feucht
k		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
		Senke / Strecksenke
		Kerbtal
		Sohlental

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE

(k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
	g	extensiv
		aufgelassen
		keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
	g	Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland. intensiv
	g	Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
k		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Achillea millefolium
Carex nigra
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Deschampsia cespitosa
Festuca pratensis
Holcus lanatus
Juncus effusus
Phalaris arundinacea
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Scirpus sylvaticus

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Achillea ptarmica
Caltha palustris
Cerastium holosteoides
Epilobium palustre
Filipendula ulmaria
Glyceria fluitans
Iris pseudacorus
Juncus articulatus
Lathyrus pratensis
Lotus uliginosus
Lychnis flos-cuculi
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Myosotis palustris
Myosoton aquaticum
Polygonum bistorta
Ranunculus flammula
Ranunculus sceleratus
Urtica dioica

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 07.08.1997
Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Nebelung-Meyer
Foto: 1
Folgeseiten: 0

(c) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Str. 12, 12873 Güstrow, Tel. (03834) 777 - 0