Biotopname Erlenbruchwald Burnitzer Bruch		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								X	X								TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr> </table>		0	2	0	8	4	2	4	4	0	2	6	Biotop-Nr.														
	X	X																																												
0	2	0	8																																											
4	2	4																																												
4	0	2	6																																											
Standort /Geologie Moor- und Anmoorbildungen				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																										
Naturraum Nord- und ostrügensches Hügel- und Boddenland				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>8</td><td>7</td></tr> </table>		1	5	6	0	1	8	7	Bild-Nr.																																	
1	5	6																																												
0	1	8	7																																											
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table>		1	2	2			Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>				2	3	<table border="1"> <tr><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table>		8	9	0	5																												
1	2	2																																												
		2	3																																											
8	9	0	5																																											
Landkreis / Kreisfreie Stadt Rügen		Gemeinde / Stadt Buschvitz Ralswiek		Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																														
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 03139				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																																										
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																												
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																						
Code		W	N	R	W	F	D	V	W	N																																				
%		6	0	2	0	2	0																																							
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Erlenbruch, Schwertlilien-Erlenbruch, Brennessel-Erlenwald, Grauweiden-Feuchtgebüsch																																														
Habitats + Strukturen		H	D	K	H	D	L	H	S	E	H	Z	R	H	T	A	H	T	B	H	A	A																								
Beschreibung / Besonderheiten Ausgedehnter, frischfeuchter bis nasser, z.T. unter Wasser stehender Erlenbruchwald im Burnitzer Bruch, um den Osser gelegen, umgeben von Ackerfläche, Verlandungsröhricht vom Osser und Grünland. Baumschicht aus dominierenden, z.T. mehrstämmigen Schwarz-Erlen und einigen Eschen. Strauchschicht fast gar nicht entwickelt. In den äußeren Bereichen ist der Erlenbruch frisch-trocken mit viel Brennesseln, zum Osser hin wird er schnell feuchter, bis er nicht weiter durch hoch stehendes Wasser begehbar ist, durch hoch stehendes Wasser. In diesen Bereichen dominiert stark die Sumpf-Segge und die Wasser-Schwertlilie. In einigen Randbereichen geht der Erlenbruch in Grauweiden-Feuchtgebüsch über.																																														
Wertbestimmende Kriterien																																														
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum												vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																		
Gefährdung																																														
<table border="1"> <tr><td>Y</td><td>W</td><td>G</td><td>Y</td><td>W</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>												Y	W	G	Y	W	S																		keine Gefährdung ☐											
Y	W	G	Y	W	S																																									
Empfehlung																																														
<table border="1"> <tr><td>Z</td><td>S</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>												Z	S	E																																
Z	S	E																																												

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 2 0 8 - 4 2 4 - 4 0 2 6

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alnus glutinosa

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<i>Arctium cf. tomentosum</i>	<i>Athyrium filix-femina</i>	<i>Carex acutiformis</i>	<i>Cirsium oleraceum</i>
<u><i>Crepis paludosa</i></u>	<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Deschampsia cespitosa</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>
<i>Festuca gigantea</i>	<i>Filipendula ulmaria</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Galeopsis tetrahit</i>
<i>Geranium robertianum</i>	<i>Geum urbanum</i>	<i>Holcus lanatus</i>	<i>Iris pseudacorus</i>
<i>Juncus effusus</i>	<i>Lycopus europaeus</i>	<i>Lysimachia vulgaris</i>	<i>Padus avium</i>
<i>Phalaris arundinacea</i>	<i>Ranunculus repens</i>	<i>Rubus idaeus</i>	<i>Salix cinerea</i>
<i>Urtica dioica</i>			

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<i>Berula erecta</i>	<u><i>Carex disticha</i></u>	<i>Myosotis palustris</i>	<i>Myosoton aquaticum</i>
<i>Rumex sanguineus</i>			

Angaben zur Fauna
 Zahlreiche Grasfrösche (*Rana temporaria* cf) beobachtet.

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 07.08.1997
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: Nebelung-Meyer	Foto: 1 Folgeseiten: 0