Biotopname Feuchtwaldkomplex etwa 1,2 km nördlich Neu Güstelitz		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								X																			TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td></tr> </table>		0	2	0	8	4	4	4	4	0	2	7
	X																																								
0	2	0	8																																						
4	4	4																																							
4	0	2	7																																						
Standort /Geologie vermoorte Senke in kuppiger Endmoräne				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																					
Naturraum Flach- und Hügelland von Inner-Rügen und Halbinsel Zudar 2 1 0				Film-Nr. 1 5 6 - 0 4 3 9 Bild-Nr. 1 5 6 - 0 4 4 0 Luftbild-Nr.																																					
Landkreis / Kreisfreie Stadt Rügen		Gemeinde / Stadt Putbus, Stadt Sehlen		Größe in ha <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						2																															
				2																																					
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 04536				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> FND <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> NP <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> FiB <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> NSG <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> LSG 1 BR <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> FFH-Geb. <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> ND <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> GLB <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> FnB <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table> Wald-Totalreservat <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"> <tr><td></td></tr> </table>																																					
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																									
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																			
Code W F R		W N A		W F B		W F E																																			
% 5 5		2 0		1 5		1 0																																			
Vegetationseinheiten feuchter Erlen-Bruchwald; Pfeifengras-Torfmoos-Birken-Bruchwald; Pfeifengras-Eichen-Moorwald; Eschen-Mischwald																																									
Habitats + Strukturen																																									
Beschreibung / Besonderheiten Heterogener Feuchtwaldkomplex im Forst Pastitz ca. 1,2 km nördlich von Neu Güstelitz. Der Bestand befindet sich im Randbereich eines größeren, stark entwässerten und durch Aufforstung mit Fichten und Lärchen stark gestörten ehemaligen Zwischen- und Hochmoorkomplexes. Den größten Teil der Biotopfläche nimmt ein mittelalter, sumpfschilfreicher, feuchter Erlen-Bruchwald ein. Im Norden sind weiterhin ein jüngerer Pfeifengras-Torfmoos-Birken-Bruchwald und ein aus Altbäumen aufgebauter Pfeifengras-Eichen-Moorwald ausgebildet. Im Südwesten ist auf ansteigendem Gelände auf feuchtem Lehm kleinflächig auch ein Eschen-Mischwald vorhanden. Eine Beeinträchtigung geht vor allem von dem hier gelegenen, tiefen Entwässerungsgraben aus, der großflächig eine Grundwasserabsenkung hervorruft.																																									
Wertbestimmende Kriterien																																									
☐ Artenreichtum (Flora)				☒ vielfältige Standortverhältnisse																																					
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten				☐ historische Nutzungsformen																																					
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				☐ aktuelle Nutzung																																					
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				☐ Flächengröße / Länge																																					
☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				☒ Umgebung relativ störungsarm																																					
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				☐ landschaftsprägender Charakter																																					
☐ typische Zonierung von Biotoptypen				☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																					
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																									
Gefährdung																																									
Y W S		Y W G				keine Gefährdung ☐																																			
Empfehlung																																									
Z S X																																									

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10		Biotop-Nr.										
				0	2	0	8	-	4	4	4	-	4	0	2	7
Substrat	Trophie	Wasserstufe	Relief	Exposition												
k g	k g	k g	k g	k g	k g											
☐ g	Torf, wenig gestört	☐ ☐	dystroph	☐ ☐	trocken	☐ ☐	eben	☐ ☐	N							
☐ ☐	Torf, degradiert	☐ ☐	oligotroph	☐ ☐	mäßig trocken	☐ ☐	wellig	☐ ☐	NO							
k ☐	Antorf	k ☐	mesotroph	☐ ☐	wechselfeucht	☐ ☐	kuppig	☐ ☐	O							
☐ ☐	Sand	☐ g	eutroph	☐ ☐	frisch	☐ ☐	dünig	☐ ☐	SO							
☐ ☐	Kies / Steine	☐ ☐	poly- / hypertroph	☐ g	feucht	☐ ☐	Berg / Rücken	☐ ☐	S							
k ☐	Lehm	☐ ☐		☐ g	sehr feucht	☐ ☐	Riedel	☐ ☐	SW							
☐ ☐	Ton	☐ ☐		k ☐	naß	☐ ☐	Flachhang <= 9°	☐ ☐	W							
☐ ☐	Halbkalk / Kalk	☐ ☐		☐ ☐	offenes Wasser	☐ ☐	Steilhang > 9°	☐ ☐	NW							
☐ ☐	Schlamm / Faulschlamm	☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐	Nische	☐ ☐								
☐ ☐	gestörter Boden	☐ ☐		☐ ☐	quellig	☐ ☐	Senke / Streckensenke	☐ ☐								
☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐	Kerbtal	☐ ☐								
☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐	Sohlentäl	☐ ☐								

NUTZUNGSMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		Umgebung		k g	
Nutzungsintensität		k g		k g		k g	
☐ ☐	intensiv	☐ ☐	Fischerei	☐ ☐	Acker / Gartenbau	☐ ☐	Fließgewässer
☐ ☐	extensiv	☐ ☐	Angeln	☐ ☐	Ackerbrache	☐ ☐	Stillgewässer
☐ ☐	aufgelassen	☐ ☐	Erholung	☐ ☐	Grünland, intensiv	☐ ☐	Trockenbiotop
☐ g	keine Nutzung	☐ ☐	Kleingartenbau	☐ ☐	Grünland, extensiv	☐ ☐	Grünanlage / Kleingarten
		☐ ☐	Erwerbsgartenbau	☐ g	Laub- / Mischwald	☐ ☐	Weg
		☐ ☐	Ferienhäuser	k ☐	Nadelwald	☐ ☐	Straße, Parkplatz
		☐ ☐	Bodenentnahme	☐ ☐	Feuchtwald / -gebüsch	☐ ☐	Bahnanlage
		☐ ☐	Verkehr	☐ ☐	Gehölz	☐ ☐	Gewerbe / Industrie
		☐ ☐	Ver- / Entsorgungsanlage	☐ ☐	Röhricht / Feuchtbrache	☐ ☐	Silo / Stallanlage
		☐ ☐	sonstige Nutzung:	☐ ☐	Hochstauden / Ruderalflur	☐ ☐	Gebäude / Siedlung
		☐ ☐		☐ ☐	Graben	☐ ☐	Spülfeld / Halde
		☐ ☐				☐ ☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
 Alnus glutinosa

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
 Betula pubescens Carex acutiformis Molinia caerulea Phalaris arundinacea

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Acer pseudoplatanus	Agrostis stolonifera	Athyrium filix-femina	Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis canescens	Callitriche palustris	Cardamine amara	Carex elata
Carex elongata	Carex remota	Carpinus betulus	Circaea lutetiana
Corylus avellana	Deschampsia cespitosa	Dryopteris carthusiana	Dryopteris dilatata
Equisetum palustre	Filipendula ulmaria	Frangula alnus	Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum	Geranium robertianum	Glechoma hederacea	Glyceria fluitans
Hottonia palustris	Iris pseudacorus	Lycopus europaeus	Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica	Mercurialis perennis	Oxalis acetosella	Quercus robur
Ranunculus repens	Rubus idaeus	Solanum dulcamara	Sphagnum spec.

...

Angaben zur Fauna
keine

Verwendete Unterlagen	keine	Datum erste Begehung:	01.11.1996
		Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in:	Nebelung-Obst	Foto:	2
		Folgeseiten:	1

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0 2 0 8 - 4 4 4 - 4 0 2 7

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Stachys sylvatica
Vaccinium myrtillusStellaria gramineaThelypteris palustris

Ulmus glabra