Biotopname																					TK	10					Biote	op-N	lr.
Salz-Schilfröhricht südwestlich von Tess							nan	nsd	lorf		T				\neg			0	3	0	5	-	3	3	2	- 4	0	1	8
											T			\top	寸					Ans	chlu	ßiŗ	1 TK		_		-		
											T				T							-							
Standort /Geologie											1	>			T		1					-			_				
ehemaliges Küstenüberflutungsmoor																						- [
Naturraum Neubukower Becken mit Hal								sel \	Wustr	ow													Fil	m-N	r.	_	Bild	l-Nr	
1 0 3										•							Luft	bild-	Nr.				1	4	1	- 0	1	7	2
Landkreis / Kreisfreie Stadt								0																					
	d Dobe		Staut				Gemeinde / Stadt Am Salzhaff							Größe in ha							\rightarrow	1	, 5	2	5	0			
Du	a						/ III Gaizilali							Länge in m							\dashv	,							
lfd.	Nr. im F	Biotopverze	ichnis				1								min. Breite in m , , , , , , , , , , , , , , , , , ,														
000		5.0.0 p 10.20					4								iberwiegend 3 - zum geringen Teil														
									NL	РΓ		1 - V	Olio	FN	Г		NP FiB												
Sch	utzmer	kmale				,	NSG					LSG 1			BR							FFH-Geb.							
ges	chützt n	ach §20 LNa	atG M-V		X				_	·	1			GLB			FnB) Wal			ld-Totalreservat				1		
		Hauptcod.	Nobone	rodo			ND					GLB							J			Überlagerungscode				-do			
		-																					oberiagerungscode				ue		
	Code	K V R	B F	_ X				<u> </u>															_						\perp
	%	9 5		5																									
Stra	jetation andsims	seinheiten en-Schilfröhr	richt Que	ecken-	Rohro	rlanz	raras	s-Frl	en-Fel	ldaek	nöl:	7																	
Hal	oitate +	Strukturen			1			l		1			1															I	
		1 1		1	1			ı		ī	ı		ı						ı							1		1	
Zwe Wa	ei kleine l	oerflutet; höherliegend id in benach land.	de Erlen- barten G	Feldge Fräben	ehölze meist	; t flurg	gleic	h;																					
We	Wertbestimmende Kriterien																												
	Artenreichtum (Flora)														_		tandortverhältnisse												
	Vorkommen seltener/typischer Tierarten															Nutzungsformen													
seltener/gefährdeter Pflanzenbestand								aktuelle																					
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft								Flächengrö																					
x natürliche / naturnahe Ausprägung des Bioto								· —																					
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Bioto								ps landsch							scha	afts	präge	nde	rCh	arak	ter								
typische Zonierung von Biotoptypen												٦	Γritts	steinbiotop/Vernetzungsfunktion															
	Struktur	r- und Habita	treichtur	m																									
Υ	ährdung W E pfehlun	Y W D																					ŀ	keine	Gel	fährdı	ıng		
				ı			1																						
7	9 E	7 S D																											

ST	ΆN	DORTMERKMALE	(k - k	leinflächig, g - großfl	lächi	g)			Т	K10			Biotop-Nr.			
Substrat								0 3	3 0 5	-	3	3 2 -	4 0 1 8			
Sub		at	Trophie k g	e W	lasse k	erst g	ufe	Relief k g				Expo k	sition g			
	g	Torf, wenig gestört		dystroph			trocken	g	eben				N			
	g	Torf, degradiert		oligotroph			mäßig trocken		wellig				NO			
		Antorf	mesotroph			g	wechselfeucht		kuppig				o			
		Sand	g	eutroph			frisch		dünig				so			
	Kies / Steine			poly-/hypertroph			feucht		Berg / F	rg / Rücken			s			
	Lehm					g	sehr feucht		Riedel				SW			
Ton						g	naß		Flachha	-		,	<u> </u>			
Halbkalk / Kalk							offenes Wasser		Steilhar	ng > 9	9°		NW			
Schlamm/Faulschlamm						_	1		Nische							
							quellig		Senke/	Stree	CKS	enke				
		gestörter Boden							Kerbtal	ol.						
	.T7	UNICOMEDIZMALE	/ 1 1	Lata (IV alata ana ana Of	19 - 1- *				Sohlent	aı						
		UNGSMERKMALE gsintensität	(K - K	leinflächig, g - großf	lachi	g)	Umgebung			k ç	9					
k	g	_	k g	1			k g					Fließgewä				
		intensiv		Fischerei			Acker/Gar	tenbau				Stillgewässer				
		extensiv		Angeln			Ackerbrach					otop				
	aufgelassen Erholung						9 Grünland.ir			\vdash	_	_	e/Kleingarten			
	g keine Nutzung			Kleingartenbau			Grünland, e					Weg				
				Erwerbsgartenbau			Laub-/Miso	chwald			_	Straße, Pa	•			
	Nutzungsart			Ferienhäuser			Nadelwald	.,		\vdash	_	Bahnanlag				
k	g	Acker		Bodenentnahme			Feuchtwald	i/-gebu	sch	\vdash	_	Gewerbe / Industrie Silo / Stallanlage				
	Wiese Verkehr Verkehr Ver-/Entsorgung					an	Gehölz Röhricht/F	oughthr	acho	\vdash	_	Gebäude/Siedlung				
	Weide			sonstige Nutzung:	arnaţ	ye	Hochstaude					Spülfeld / Halde				
		forstliche Nutzung		Sonstige Natzung.			g Graben	en / Ruc	Jeramur	Bodenentnahme						
							Orabon									
	Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)															
Ph	ragi	mites australis														
		•		en: Art der Roten Liste		fett:	•									
Ale	opeo	curus geniculatus	Во	lboschoenus maritim	ius		Myosoton aquaticum									
				en: Art der Roten Liste	MV,	fett:				-1						
	•	glutinosa a repens		iplex prostrata ncus effusus			Deschampsia cespite Nasturtium microphy		Elytrigia juncea Phalaris arundinacea							
Po	tent	illa anserina	Ru	ppia maritima			Schoenoplectus tabe	rnaemo	ntani l	ani Urtica dioica						
Ang	jabe	n zur Fauna														
Ver	wen	dete Unterlagen											18.10.1996			
Res	arhei:	ter/in: IBS-Weinauge							Dat		tzte 1	Begehung:	Folgeseiten: 0			
בסכו	" DCI	- vveiriauge							=00	J.	1		. 5.950011011. 0			