Biotopname Verlandungsmoor am Schnatermannsweg		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																X																TK10 0 3 0 6 - 1 4 3 - 4 0 0 6		Biotop-Nr.	
		X																																			
Standort / Geologie vermoorte Streckensenke in der Grundmoräne				Anschluß in TK																																	
Naturraum Toitenwinkel 1 1 1				Luftbild-Nr.		1 4 2 - 0 1 7 8																															
Landkreis / Kreisfreie Stadt Kreisfreie Stadt		Gemeinde / Stadt Rostock, Hansestadt		Größe in ha		6 1 7 1																															
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 00192				Länge in m																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒				min. Breite in m																																	
				max. Breite in m																																	
		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																																			
		NLP ☐		FND ☐		NP ☐																															
		NSG 1		LSG ☐		BR ☐																															
		ND ☐		GLB ☐		FnB ☐																															
						FiB ☐																															
						FFH-Geb. ☐																															
						Wald-Totalreservat ☐																															
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																															
Code		W N R																																			
%		1 0 0																																			
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Erlenbruch																																					
Habitats + Strukturen		H D R		H D K		H S E																															
						H A O																															
						H T S																															
						H T L																															
Beschreibung / Besonderheiten Überstauter Sumpfschilf-Erlenbruchwald in einer vermoorten Streckensenke im Forstgebiet Schnatermann am Schnatermannsweg. Die Krautschicht besteht überwiegend aus Sumpfschilf. Die Baumschicht setzt sich aus Schwarzerlen und Moorbirken zusammen, wobei einige Bäume abgestorben sind. Das Substrat besteht aus überstautem, eutrophen, wenig gestörten Torf.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
☐ Artenreichtum (Flora)						vielfältige Standortverhältnisse																															
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten						historische Nutzungsformen																															
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand						aktuelle Nutzung																															
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft						Flächengröße / Länge																															
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops						Umgebung relativ störungsarm																															
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops						landschaftsprägender Charakter																															
☐ typische Zonierung von Biotoptypen						Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																															
☒ Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung																																					
						keine Gefährdung ☒																															
Empfehlung																																					
Z M S																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 3 0 6 - 1 4 3 - 4 0 0 6

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐		sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐	g	offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐		eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Strecksenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐	g	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Alnus glutinosa Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Betula pubescens Calamagrostis canescens Carex remota Deschampsia cespitosa
 Dryopteris carthusiana Glecoma hederacea Juncus effusus Lemna minor
 Oxalis acetosella Phragmites australis Picea abies **Polytrichum commune**
 Rubus fruticosus Veronica beccabunga

Angaben zur Fauna
keine

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 04.11.2002

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Ing.-Büro Walther

Foto: 1

Folgeseiten: 0