Biotopname
Feuchtwiese südl.d.Försterschneise westl.Wilmshagen

Standort /Geologie
Beckensand/Versumpfungsmoor

	X				

TK10 0306 - 241 - **Biotop-Nr.** 4008

Anschluß in TK
-
-
-

Naturraum Rostock-Gelbensander Heide
112

	Film-Nr.		**Bild-Nr.**
Luftbild-Nr.	142	-	0335
		-	
Größe in ha	0	,	8963
Länge in m		,	
min. Breite in m		,	
max. Breite in m		,	

Landkreis / Kreisfreie Stadt
Nordvorpommern

Gemeinde / Stadt
Ribnitz-Damgarten, Stadt

lfd. Nr. im Biotopverzeichnis
01127

Schutzmerkmale
geschützt nach §20 LNatG M-V ☒

1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil

NLP	☐	FND	☐	NP	☐	FiB	☐
NSG	☐	LSG	☐	BR	☐	FFH-Geb.	☐
ND	☐	GLB	☐	FnB	☐	Wald-Totalreservat	☐

	Hauptcod.	**Nebencode**								**Überlagerungscode**	
Code	GFR	FGN	WFR							UMS	
%	85	10	5								

Vegetationseinheiten
Honiggras-Waldsimsen-Feuchtwiese, Waldsimsen-Sumpfseggen-Feuchtwiese, Sumpfreitgras-Erlenwald

Habitate + Strukturen

Beschreibung / Besonderheiten
Von Wald umgebene Wiese deren größter Teil von einer Honiggras-Waldsimsen- bzw. Honiggras-Waldsimsen-Sumpfseggen-Wiese eingenommen wird;
Beide Wiesentypen auf eutrophem, sehr feuchtem, vererdetem Torf sind miteinader verzahnt.
Weitere charakteristische Arten sind: Flatterbinse, Wiesenschaumkraut, Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Fuchsschwanz, Sumpfkratzdistel).
Die Wiese wird extensiv gemäht, sie ist durch Gräben (z. T. mit jungen lückigen Erlenreihen) in mehrere Fächer gegliedert. Rest der Wiese wird von gestörtem Feuchtgrünland eingenommen.
Im Westen ragt kleiner Erlenwald (mit Sumpfreitgras, Wasserminze, Sumpfsegge in der Krautschicht) in den Wiesenbereich hinein.

Wertbestimmende Kriterien

☐	Artenreichtum (Flora)	☐	vielfältige Standortverhältnisse
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☐	historische Nutzungsformen
☐	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐	aktuelle Nutzung
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	☐	Flächengröße / Länge
☐	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐	Umgebung relativ störungsarm
☒	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐	landschaftsprägender Charakter
☐	typische Zonierung von Biotoptypen	☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion
☐	Struktur- und Habitatreichtum	☐	

Gefährdung

YWE

keine Gefährdung ☐

Empfehlung

ZSE

STANDORTMERKMALE

(k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10				-				-	Biotop-Nr.			
0	3	0	6	-	2	4	1	-	4	0	0	8

Substrat

k	g	
k		Torf, wenig gestört
	g	Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamr
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
		mesotroph
	g	eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
	g	feucht
k		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
		Senke / Strecksenke
		Kerbtal
		Sohlental

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE

(k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
	g	extensiv
		aufgelassen
		keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
	g	Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland. intensiv
	g	Grünland, extensiv
	g	Laub- / Mischwald
	g	Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex acutiformis	Holcus lanatus	Scirpus sylvaticus

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Cardamine amara	Juncus effusus	Phalaris arundinacea	Ranunculus acris

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Alnus glutinosa	Alopecurus pratensis	Calamagrostis canescens	Carex nigra
Cerastium holosteoides	Cirsium palustre	Deschampsia cespitosa	Filipendula ulmaria
Galium aparine	Galium palustre	Glecoma hederacea	Juncus articulatus
Lathyrus pratensis	Lychnis flos-cuculi	Mentha aquatica	Poa pratensis
Potentilla erecta	Prunella vulgaris	Ranunculus flammula	Ranunculus repens
Rumex acetosella	Taraxacum officinale	Vicia cracca	

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 06.11.1997

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Pries

Foto: 1

Folgeseiten: 0

(c) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Str. 12, 12873 Güstrow, Tel. (03834) 777 - 0