Biotopname Schwarzerlen-Weidensumpf westlich vom Rudass		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											X																											TK10 0 3 0 6 - 4 4 3 - 4 0 1 4		Biotop-Nr.	
			X																																								
Standort /Geologie vermoorte Streckensenke in der flachwelligen Grundmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																											
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0				Luftbild-Nr. 1 3 1 - 0 1 7 0		Film-Nr.		Bild-Nr.																																			
Landkreis / Kreisfreie Stadt Bad Doberan		Gemeinde / Stadt Sanitz Tessin, Stadt		Größe in ha		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>					0	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																															
			0																																								
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 08898				min. Breite in m																																							
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FIB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐		max. Breite in m																																							
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																					
Code		V W N		V G R		U M S																																					
%		7 0		3 0																																							
Vegetationseinheiten Schwarzerlen-Grauweidenbegüsch, Sumpfschilf-Ried																																											
Habitats + Strukturen D H B																																											
Beschreibung / Besonderheiten Schwarzerlen-Grauweidenbegüsch westlich vom Rudass in einer vermoorten, flachgründigen Streckensenke in der flachwelligen Grundmoräne. Das Versumpfungsmoor weist in seiner Gehölzschicht deckend Grau-Weide und zahlreich Schwarz-Erle auf. Der Baumbestand ist ca. 15 Jahre alt und sehr dicht. Das Zentrum ist überstaut und weist ein Sumpfschilf-Ried auf. In der Krautschicht ist Sumpfschilf und Teich-Schachtelhalm deckend. Zahlreich tritt Flutender Schwaden, Wasserhahnenfuß (RLA-2) und Schmalblättriger Rohrkolben auf. Vereinzelt ist u.a. Ufer-Segge und Schwertlilie (BAV) zu finden. In der Umgebung befindet sich ein Fließgewässer und hinter einer Hochstaudenflur intensiv bewirtschaftetes Acker- und Grünland.																																											
Wertbestimmende Kriterien																																											
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener /typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum					☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																						
Gefährdung																																											
									keine Gefährdung ☒																																		
Empfehlung																																											

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 3 0 6 - 4 4 3 - 4 0 1 4

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm/Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly-/hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐		sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐		eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

Nutzungsart

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver-/Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	g	Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	k	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		g	Fließgewässer
☐	☐			Stillgewässer
☐	☐			Trockenbiotop
☐	☐			Grünanlage / Kleingarten
☐	☐			Weg
☐	☐			Straße, Parkplatz
☐	☐			Bahnanlage
☐	☐			Gewerbe / Industrie
☐	☐			Silo / Stallanlage
☐	☐			Gebäude / Siedlung
☐	☐			Spülfeld / Halde
☐	☐			Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Carex acutiformis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Equisetum fluviatile

Salix cinerea

Pflanzenarten ±zahlreich
Alnus glutinosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Glyceria fluitans

Ranunculus aquatilis

Typha angustifolia

Pflanzenarten vereinzelt
Aegopodium podagraria
Deschampsia cespitosa
Lemna minor
Ranunculus sceleratus
Urtica dioica

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Caltha palustris
Galium palustre
Mentha aquatica
Rumex hydrolapathum

Carex riparia
Glechoma hederacea
Ranunculus ficaria
Solanum dulcamara

Cirsium oleraceum
Iris pseudacorus
Ranunculus repens
Stellaria holostea

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 23.04.1998

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Nebelung-Walther

Foto: 1

Folgeseiten: 0