Biotopname Erlenbruch westlich vom Tramper Moor		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																											TK10 0 3 0 7 - 1 2 3 - 4 0 0 6		Biotop-Nr.	
Standort /Geologie Versumpfungsmoor in der Grundmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																											Anschluß in TK			
Naturraum Lehmplatten nördlich der Peene 2 0 0		Gemeinde / Stadt Trinwillershagen		Film-Nr. Luftbild-Nr. 1 4 2 - 0 5 5 4		Bild-Nr.																										
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordvorpommern				Größe in ha 0		Länge in m		min. Breite in m																								
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 05617		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐		max. Breite in m																												
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																												
Code W N R				U M S																												
% 1 0 0																																
Vegetationseinheiten Sumpfschilf- Erlenbruch																																
Habitats + Strukturen		H D K	H S E	H Z I	H M S	H A O	H T A	H T B																								
Beschreibung / Besonderheiten Im südlichen Langenhanshäger Wald östlich des Tramper Moors in einer schwach ausgeprägten Senke gelegener Sumpfschilf-Erlenbruch, der mit dem Tramper Moor über einen flache Rinne mit einem feuchten Eschenwald verbunden ist. Die Baumschicht des Bruchwalds enthält Schwarz- Erlen (<i>Alnus glutinosa</i>). Eine Strauchschicht ist nicht ausgebildet. In der Krautschicht dominieren Sumpfschilf (<i>Carex acutiformis</i>). Vereinzelt treten Gelbe Schwertlilie (<i>Iris pseudacorus</i> , BAV), Bach- Nelkenwurz (<i>Geum rivale</i>) und Dornfarn (<i>Dryopteris carthusiana</i>) auf. Bei Weiterführung der derzeitigen Nutzung und möglichst reduzierter Entwässerung ist der Bestand nicht gefährdet.																																
Wertbestimmende Kriterien																																
Artenreichtum (Flora)				vielfältige Standortverhältnisse																												
Vorkommen seltener / typischer Tierarten				historische Nutzungsformen																												
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				☒ aktuelle Nutzung																												
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				Flächengröße / Länge																												
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				☒ Umgebung relativ störungsarm																												
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				landschaftsprägender Charakter																												
typische Zonierung von Biotoptypen				☒ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																												
Struktur- und Habitatreichtum																																
Gefährdung																																
Y W G				keine Gefährdung ☐																												
Empfehlung																																
Z S E				Z W E																												

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 3 0 7 - 1 2 3 - 4 0 0 6

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☒	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☒	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☒	Senke / Strecksenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	intensiv
☐	☒	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☒	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☒	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alnus glutinosa

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Ajuga reptans **Carex sylvatica** Deschampsia cespitosa Dryopteris carthusiana
Geum rivale **Iris pseudacorus** Quercus robur

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 30.10.1999

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: StAUNHST-Krüger/Münnich

Foto: 1

Folgeseiten: 0