Biotopname Feuchtwiese im Trebeltal 1,25 km SSW Bassendorf		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																X																						TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr> </table>		0	3	0	7	4	3	3	4	0	5	0
		X																																																		
0	3	0	7																																																	
4	3	3																																																		
4	0	5	0																																																	
Standort /Geologie Flachhang/Durchströmungsmoor/Flußtalmoor		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
Naturraum Grenztal und Peenetal 2 0 2		Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table>		1	3	1	0	1	0	5																																										
1	3	1																																																		
0	1	0	5																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Güstrow		Gemeinde / Stadt Wasdow																																																		
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 00442		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					3																																													
			3																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG 1 LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
Hauptcod.		Nebencode																																																		
Code G F R		G F D G F F F G N																																																		
% 5 2		4 0 7 1																																																		
Vegetationseinheiten Schlankseggen-Feuchtwiese, Kammseggen-Feuchtwiese, Rohrglanzgras-Sumpfschilf-Feuchtwiese, Kriechhahnenfuß-Rohrglanzgras-Feuchtwiese, Kriechhahnenfuß-Flatterbinsen-Feuchtwiese, Kriechhahnenfuß-Rasenschmielen-Feuchtwiese,																																																				
Habitate + Strukturen																																																				
Beschreibung / Besonderheiten weitere Vegetationseinheiten: Flutschwaden-Weißstraußgras-Flutrasen Feuchtwiese im Trebeltal auf melorativ beeinträchtigtem Durchströmungsmoor innerhalb der überwiegend landwirtschaftlich genutzten, flachwelligen Grundmoräne von gestörtem Feuchtgrünland umgeben. Auf sehr feuchten, mäßig degradierten Torfen hat sich infolge von Entwässerung und ehemals intensiver Grünlandnutzung ein Mosaik aus Feuchtwiesen eutropher Moor- und Sumpfstandorte in der Ausbildung als Schlankseggen-Feuchtwiese, Kammseggen-Feuchtwiese bzw. Rohrglanzgras-Sumpfschilf-Feuchtwiese und gestörtem Feuchtgrünland als Kriechhahnenfuß-Rohrglanzgras-Feuchtwiese, Kriechhahnenfuß-Flatterbinsen-Feuchtwiese bzw. Kriechhahnenfuß-Rasenschmielen-Feuchtwiese herausgebildet. Das zahlreiche Auftreten von Wassernabel und Wiesensegge deutet kleinflächig auch auf mesotrophe Standortverhältnisse hin. Bedingt durch eine partiell auftretende Sekundärvernässung konnte kleinflächig auch der Flutschwaden-Weißstraußgras-Flutrasen beobachtet werden. Aus floristischer Sicht ist das z.T. zahlreiche Auftreten von Zweizeiliger Segge, Wiesensegge, Wassernabel, Kuckuckslichtnelke und Gelber Wiesenraute hervorzuheben. Zum Erhalt und zur Wiederherstellung einer artenreichen Feuchtwiese ist eine Einschränkung der Entwässerung anzustreben.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐ Artenreichtum (Flora)	☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft																																																	
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐ typische Zonierung von Biotoptypen	☐ Struktur- und Habitatreichtum																																																	
☐ vielfältige Standortverhältnisse	☐ historische Nutzungsformen	☐ aktuelle Nutzung	☐ Flächengröße / Länge																																																	
☐ Umgebung relativ störungsarm	☐ landschaftsprägender Charakter	☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																		
Gefährdung																																																				
Y W E Y W G		keine Gefährdung ☐																																																		
Empfehlung																																																				
Z S E																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 3 0 7 - 4 3 3 - 4 0 5 0

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☒	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☒	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☒	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☒	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☒	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☒	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☒	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex gracilis *Phalaris arundinacea*

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Agrostis stolonifera *Carex acutiformis* *Carex disticha* *Carex nigra*
Deschampsia cespitosa *Filipendula ulmaria* *Hydrocotyle vulgaris* *Juncus articulatus*
Juncus effusus *Lemna minor* *Mentha aquatica* *Potentilla anserina*
Ranunculus repens *Rumex acetosa* *Thalictrum flavum*

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Caltha palustris *Leontodon autumnalis* *Lychnis flos-cuculi* *Phragmites australis*
Ranunculus acris *Rumex crispus* *Taraxacum officinale*

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 17.10.2002

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Teppke

Foto: 1

Folgeseiten: 0