Biotopname Schilf-Röhricht am süd-östl. Graben des Krummhagener See's		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											X	X																										TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> </table>		0	3	0	8	1	3	1	4	0	0	9
			X	X																																																
0	3	0	8																																																	
1	3	1																																																		
4	0	0	9																																																	
Standort /Geologie vermoorte Streckensenke in der welligen Grundmoräne		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
Naturraum Lehmplatten nördlich der Peene <table border="1"> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		2	0	0			Film-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td></tr> </table>		1	2	2	0	1	8	2																																					
2	0	0																																																		
1	2	2																																																		
0	1	8	2																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordvorpommern		Gemeinde / Stadt Elmenhorst Wendorf		Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 13876				Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> </table>					3	0	0	0	9																																							
			3																																																	
0	0	0	9																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
		Hauptcod.		Nebencode																																																
		Code V R L		V W N																																																
		V G R		U M V																																																
		%																																																		
		4 0		3 5																																																
		2 5																																																		
Vegetationseinheiten Brennessel-Schilf-Röhricht, Grauweiden-Ohrweiden-Gebüsch, Sumpfschilf-Ried																																																				
Habitats + Strukturen																																																				
Beschreibung / Besonderheiten Verlandungsmoor am süd-östlichen Graben des Krummhagener See's in einer vermoorten Streckensenke der welligen Grundmoräne. Der größte Teil dieses Verlandungsmoores wird von einem Brennessel-Schilf-Röhricht eingenommen, das fließend in ein Grauweiden-Ohrweiden-Gebüsch übergeht. Dazwischen sind Flächen mit Sumpfschilf-Rieder angesiedelt. Die Krautschicht ist in allen Teilen des Verlandungsmoores sehr stark entwickelt und ändert nur ihre Artenhäufigkeit. Schilf tritt überwiegend deckend auf. Zahlreiche Arten in der Krautschicht sind Brennessel, Sumpf-Reitgras und Sumpf-Segge. Weitere vereinzelte Arten sind u.a. Wald-Engelwurz (RL-3), Steif-Segge, Schein-Zyperngras-Segge, Ufer-Segge, Walzen-Segge, Sumpf-Haarstrang, Breitblättriger Rohrkolben, Sumpf-Ziest, Flatter-Binse und Wasser-Minze. In der Baumschicht des Grauweiden-Ohrweiden-Gebüsch ist Grau- und Ohr-Weide zahlreich. Weitere Gehölze kommen hinzu wie: Lorbeer-Weide, Purgier-Kreuzdorn, Faulbaum und einige naturverjüngte Schwarz-Erlen aus dem angrenzenden Laubwald. Das Substrat des Verlandungsmoores besteht überwiegend aus nassem, eutrophem, degradierten Torf. Die Umgebung wird von einem Graben im Norden und einem Laubwald im Süden bestimmt. Sukzessiv wird sich der Bestand des Grauweiden-Ohrweiden-Gebüsches in das Röhricht ausbreiten. Auch werden die Anteile der Seggen-Rieder geringer.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐ Artenreichtum (Flora)		☐ vielfältige Standortverhältnisse																																																		
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten		☐ historische Nutzungsformen																																																		
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		☐ aktuelle Nutzung																																																		
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		☐ Flächengröße / Länge																																																		
☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		☒ Umgebung relativ störungsarm																																																		
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		☐ landschaftsprägender Charakter																																																		
☒ typische Zonierung von Biotoptypen		☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																		
☒ Struktur- und Habitatreichtum																																																				
Gefährdung																																																				
keine Gefährdung ☒																																																				
Empfehlung																																																				
<table border="1"> <tr><td>Z</td><td>M</td><td>S</td></tr> </table>		Z	M	S																																																
Z	M	S																																																		

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 3 0 8 - 1 3 1 - 4 0 0 9

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☒	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☒	sehr feucht
☐	☒	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☒	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☒	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☒	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☒	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☒	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Phragmites australis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Calamagrostis canescens **Carex acutiformis** Salix aurita Salix cinerea
Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alnus glutinosa Angelica sylvestris Calystegia sepium Carex elata
Carex elongata Carex pseudocyperus Carex riparia Cirsium oleraceum
Cirsium palustre Deschampsia cespitosa Epilobium hirsutum Equisetum fluviatile
Eupatorium cannabinum Festuca arundinacea Filipendula ulmaria Frangula alnus
Galium palustre Geum rivale Humulus lupulus Hypericum tetrapterum
Juncus effusus Lysimachia vulgaris Lythrum salicaria Mentha aquatica
Myosotis palustris Peucedanum palustre Phalaris arundinacea Ranunculus repens
Rhamnus cathartica Salix pentandra Solanum dulcamara Sonchus palustris
Stachys palustris Symphytum officinale Typha latifolia

Angaben zur Fauna
Brutgebiet einiger Rohr- und Schilfbrüter.

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 29.09.1996
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: LAUN-Walther	Foto: 1 Folgeseiten: 0