| Biotopname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TK | (10 | | | | | В | oto | p-Nr | |
|--|---|--------------------------------|--------------|-------|------|-------|-----------------------|------|--------|------|-----|---|----------------------------|--------|----------------|--------------------|---------------------|-------|-------|------|-------------------|------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|---|
| Salzwiese 100 m südlich von Middelhage | | | | | | agen | 1 | | | | | Х | | | | | | 0 | 3 | 0 | 9 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Anschluß in TK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | t | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Geologie | | | | | | | | | t | | | + | | | | | | | | - | | | | 1 | | | | |
| Küstenüberflutungsmoor | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | _ | | | | J | | | | |
| Nat | Noturroum Nord and option on the | | | | | | | | Bod | donl | 1 | nd | | | | | | | | | | | Fil | m-N | ۱r. | | ſ | 3ild | Nr. | |
| Nord- und ostrügensches Hü | | | | | | | gei- i | una | Бои | uem | aı | nu | | | | | Luftk | oild- | Nr. | | | | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 1 2 2 | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | | | | | | | Gemeinde / Stadt | | | | | | | | Größe in ha | | | | | | | 0 | ĺ,[| 0 | 6 | 2 | 8 | | | |
| Rü | gen | | | | | | Mid | delh | ager | 1 | | | | | | | Läng | ge ir | n m | | | | | | | , [| | | | |
| | | | | | | | - | | | | | | | | | min. Breite in m , | | | | | | | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis | | | | | | | | | | | | | | | | | max. Breite in m | | | | | | | | | | | | | |
| 09751 | | | | | | | 1 - vollständig 2 - ü | | | | | | | | ük | oerwi | ege | nd | | | geri | nger | ı Tei | il | | | | | | |
| 0-1 | | | | | | | NLP | | | | | | | FNE | | | NP | | | | | | | | | F | FiB | | | |
| | utzmer chützt n | | atG M-V | | Х | | NSG | | | i 1 | | LSG 1 | | | BR 1 | | | | | | FFH-Geb. 1 | | | | 1 | | | | | |
| geschützt nach §20 LNatG M-V | | | | | | ND | | | | | | GLB | | | | FnB | | | | | Wald- | | | talre | ser | vat | | | | |
| | Hauptcod. Nebencode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Überlagerungscode | | | | | | | | | |
| | Code | K G O | K G D | G | F | D | G _I I | FıF | F | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | - | | | | | | | 1 | |
| | % | 1610 | 3 0 | | | 8 | | - | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver | | seinheiten | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fle | chtstrau | ßgras-Sump | fsimsenrase | en; S | alzs | chwa | aden | rase | n; Fle | chts | tra | außgi | as- | Rots | chwi | ing | jelras | en; | Su | mpfs | sims | en-l | Rots | chw | inge | elras | en; | | | |
| We | ißklee-F | Rotschwinge | lweide; Flec | htstr | auß | grasf | flutra | sen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hal | oitate + | Strukturen | | D | Н | М | | | | | ı | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 1 | | | | | 1 | 1 | | ı | ı | | ı | ı | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | | ung / Besor iberstaute S | | | | • | | • | | | | • | • | | · | • | • | • | | • | • | • | • | • | | | | | • | |
| | | zack zahlreid zack zu finde | | | | | | | | | | | . 9- | | | | | | | | | | , | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| We | rtbestin | nmende Kri | terien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Artenreichtum (Flora) | | | | | | | | | | | | v | ielfäl | tige | St | tandortverhältnisse | | | | | | | | | | | | | |
| | Vorkommen seltener / typischer Tierarten | | | | | | | | | | | L | historische Nutzungsformen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | seltener / gefährdeter Pflanzenbestand | | | | | | | | | | | | aktuelle Nutzung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | x seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | | | | | | | | | | | | F | läch | engr | röß | se/L | äng | е | | | | | | | | | | | |
| | natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | | | | | | | | | | | - | | _ | | elativ | _ | | ngsa | rm | | | | | | | | | | |
| | gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | | | | | | | | | | | | _ | _ | | - | | | | - | | | | | | | | | | |
| typische Zonierung von Biotoptypen | | | | | | | | | | | | landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Struktur- und Habitatreichtum | | | | | | | | | | | ╡' | IIII | CILID | not | ОΡΊ | v CII | ICtz | Lurig | Siuii | Kuo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Get | Gefährdung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfehlung | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | k | eine | · Ge | efähr | dun | g | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STANDORTMERKMALE | (k - kleinflächig, g - großf | flächig) | | | Т | K10 | | Biotop-Nr. | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|---------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Substrat | | /asserstu | ıfe | 0 Reli | | - 1 | 2 2 Ex | - 4 0 4 4 position | | | | |
| k g | k g | k g | ı | k | g | | | k g | | | | |
| g Torf, wenig gestört | dystroph | | trocken | | g eben | | | N | | | | |
| g Torf, degradiert | oligotroph | | mäßig trocken | | wellig | | | NO | | | | |
| Antorf | mesotroph | | wechselfeucht | | kuppig | | | 0 | | | | |
| Sand | g eutroph | | frisch | | dünig | | | so | | | | |
| Kies / Steine | poly- / hypertroph | g | feucht | | Berg / F | Rücken | | S | | | | |
| Lehm | | g | sehr feucht | | Riedel | | | SW | | | | |
| Ton | | | naß | | | ang <= 9 | 9° | W | | | | |
| Halbkalk / Kalk | | | offenes Wasser | | | ng > 9° | | NW | | | | |
| Schlamm / Faulschlan | mr | | l | | Nische | | | | | | | |
| | | | quellig | | | / Strecks | senke | | | | | |
| gestörter Boden | | | | | Kerbtal | | | | | | | |
| | | | | | Sohlen | tai | | | | | | |
| NUTZUNGSMERKMALE Nutzungsintensität | (k - kleinflächig, g - groß | flächig) | Umgebung | | | k g | _ | | | | | |
| k g | k g | | k g | | | | Fließgev | vässer | | | | |
| intensiv | Fischerei | | Acker / Gai | tenba | au | | Stillgewä | isser | | | | |
| g extensiv | Angeln | | Ackerbrach | e | | | Trocken | biotop | | | | |
| aufgelassen | Erholung | | Grünland. i | ntens | siv | | Grünanl | age / Kleingarten | | | | |
| keine Nutzung | Kleingartenbau | | g Grünland, e | exten | siv | | Weg | | | | | |
| | Erwerbsgartenbau | | Laub- / Mis | chwa | ıld | | Straße, I | Parkplatz | | | | |
| Nutzungsart | Ferienhäuser | | Nadelwald | | | | Bahnanl | · · | | | | |
| k g | Bodenentnahme | | Feuchtwald | l / -ge | ebüsch | | 1 | e / Industrie | | | | |
| Acker | Verkehr | | Gehölz | | | | Silo / Sta | - | | | | |
| Wiese | Ver- / Entsorgungs | sanlage | Röhricht / F | euch | itbrache | | Gebäude / Siedlung | | | | | |
| g Weide | sonstige Nutzung: | | Hochstaud | en / F | Ruderalflur | | Spülfeld / Halde | | | | | |
| forstliche Nutzung | | | Graben | | | Bodenentnahme | | | | | | |
| Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Agrostis stolonifera Eleocharis uniglumis Festuca rubra Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Phragmites australis Puccinellia distans Trifolium fragiferum Trifolium repens | | | | | | | | | | | | |
| Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Aster tripolium Leontodon autumnalis Lolium perenne Potentilla anserina | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium pratense | | | | | | | | | | | | |
| Angaben zur Fauna | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Unterlagen | | | | | Datum erste Begehung: 09.10.2001 Datum letzte Begehung: | | | | | | | |
| Bearbeiter/in: Pulkenat-Strun | nck | | | | Fot | | . 3 | Folgeseiten: 0 | | | | |