Biotopname Röhrriechkomplex nördlich von Barendorf		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 4 0 3 - 2 2 2 - 4 0 0 6		Biotop-Nr.	
			X																																		
Standort / Geologie Versumpfungsmoor/Grundmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Anschluß in TK															
Naturraum Dassower Becken 1 0 0		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Film-Nr. Luftbild-Nr. 2 0 7 - 0 1 2 3		Bild-Nr.													
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordwestmecklenburg		Gemeinde / Stadt Dassow, Stadt Kalkhorst		Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr></table>						6	Länge in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								min. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								max. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
				6																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 00640		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		NLP <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			FND <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			NP <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			FiB <table border="1"><tr><td></td></tr></table>				
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NSG <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			LSG 1 <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			BR <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			FFH-Geb. <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			Wald-Totalreservat <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			ND <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			GLB <table border="1"><tr><td></td></tr></table>			FnB <table border="1"><tr><td></td></tr></table>														
Hauptcod.		Nebencode										Überlagerungscode																									
Code		V	R	L	V	W	N	S	T	R	W	F	R	W	N	R	V	G	R	B	R	R					U	M	S								
%		5	5	2	0	1	1	5	3	3	3	3	3																								
Vegetationseinheiten Winden-Schilf-Röhrriech, Sumpfschilf-Röhrriech, Wasserdost-Schilf-Röhrriech, Sumpfschilf-Grauweiden-Gebüsch, Schilf-Grauweiden-Gebüsch, Rasenschmielen-Sumpfreitgras-Erlenwald, Sumpfschilf-Erlenwald, Uferseggen-Ried, Silberweiden-Baumreihe																																					
Habitats + Strukturen D H M																																					
Beschreibung / Besonderheiten Großer langgestreckter, eutropher, feuchter bis nasser Versumpfungsmoorkomplex mit drei Torfstichgewässern im Süden des Biotopes; Es dominiert ein windenreiches, flächig auch sumpfschilfreiches Schilf-Röhrriech, das mit nassen Grauweiden-Gebüsch (mit Sumpfschilf, Bittersüßem Nachtschatten) verzahnt ist. In flachen, verlandenden Gräben Uferseggen-Riede ausgebildet; Einzelne Erlenwaldbereiche, in denen feuchte und nasse Abschnitte kleinflächig wechseln; Auf Balken (künstlich im Zuge des Torfabbaus entstanden) sind Grauweiden mit Schilf, Wasserdost und Sumpfreitgras vergesellschaftet. Biotop grenzt großflächig an ruderalen Hochstaudenflur, z. T. durch Baumreihe von dieser getrennt; Ansonsten im Osten und Südosten an Acker (von diesem durch Graben getrennt), im Norden an Küstenschutzwald grenzend.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
Artenreichtum (Flora)														vielfältige Standortverhältnisse																							
Vorkommen seltener / typischer Tierarten														historische Nutzungsformen																							
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand														aktuelle Nutzung																							
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft														Flächengröße / Länge																							
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops														Umgebung relativ störungsarm																							
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops														landschaftsprägender Charakter																							
typische Zonierung von Biotoptypen														Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																							
Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung																																					
																										keine Gefährdung		☒									
Empfehlung																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 3 - 2 2 2 - 4 0 0 6

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	g	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

☐	☐	k	Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	k	Acker / Gartenbau
☐	☐	g	Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	k	Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	g	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	k	Graben

☐	☐	k	Fließgewässer
☐	☐	g	Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	k	Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Phragmites australis Salix cinerea

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Calamagrostis canescens Calystegia sepium Carex acutiformis

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Alnus glutinosa Alnus incana Angelica sylvestris Berula erecta
 Carex paniculata Carex riparia Cicuta virosa Cirsium palustre
 Deschampsia cespitosa Equisetum arvense Equisetum palustre Eupatorium cannabinum
 Filipendula ulmaria Fraxinus excelsior Galium palustre **Iris pseudacorus**
 Lemna minor Mentha aquatica Ranunculus repens Salix alba
 Scutellaria galericulata Solanum dulcamara

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 01.10.1997

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Weinauge

Foto: 2

Folgeseiten: 0