Biotopname Rotstraußgras-Rasen westlich Zarnewenz		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										X																												TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table>		0	4	0	3	2	4	1	4	0	0	7	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					
		X																																																								
0	4	0	3																																																							
2	4	1																																																								
4	0	0	7																																																							
Standort /Geologie Sander				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td>2</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>8</td><td>3</td></tr> </table>		2	0	7	0	3	8	3	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																															
2	0	7																																																								
0	3	8	3																																																							
Naturraum Dassower Becken <table border="1"> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		1	0	0	Gemeinde / Stadt Selmsdorf		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>					0	Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																	
1	0	0																																																								
			0																																																							
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordwestmecklenburg		lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01769		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		NLP <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FND <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			NP <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FiB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>																																											
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NSG <table border="1"> <tr><td>1</td></tr> </table>		1	LSG <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			BR <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FFH-Geb. <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			Wald-Totalreservat <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			GLB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FnB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>																																						
1																																																										
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																						
Code T M S		T M D																																																								
% 7 0		3 0																																																								
Vegetationseinheiten Bergsandknöpfchen-Rotstraußgras-Rasen, Glatthafer-Rotstraußgras-Rasen																																																										
Habitats + Strukturen																																																										
Beschreibung / Besonderheiten Flächig ausgebildeter Rotstraußgras-Rasen auf mäßig trockenem, ziemlich humosem Sand; Glatthafer auf der gesamten Fläche eingewandert; daneben noch Reste eines einstigen Pionierrasens aus Silbergras; Langfristig ist auf Grund der herrschenden Bedingungen (flache, nicht exponierte Lage, Beschattung durch angrenzenden Kiefernwald, Nährstoffverhältnisse) eine Entwicklung zur frischen Ruderalflur wahrscheinlich. Sporadisch auch Rainfarn vertreten; Im Norden geht der Rotstraußgras-Rasen in frisches Grünland (Wiese) über.																																																										
Wertbestimmende Kriterien																																																										
Artenreichtum (Flora)				vielfältige Standortverhältnisse																																																						
Vorkommen seltener / typischer Tierarten				historische Nutzungsformen																																																						
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				aktuelle Nutzung																																																						
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				Flächengröße / Länge																																																						
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				Umgebung relativ störungsarm																																																						
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				landschaftsprägender Charakter																																																						
typische Zonierung von Biotoptypen				Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																						
Struktur- und Habitatreichtum																																																										
Gefährdung																																																										
												keine Gefährdung ☒																																														
Empfehlung																																																										

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 3 - 2 4 1 - 4 0 0 7

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☒	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☒	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☒	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☒	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☒	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☒	aufgelassen
☐	☒	keine Nutzung

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☒	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☒	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Agrostis capillaris Rumex acetosella

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Arrhenatherum elatius

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Corynephorus canescens Festuca ovina agg. Hypericum perforatum Hypochaeris radicata
Jasione montana Linaria vulgaris Pinus sylvestris Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 15.09.1997

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Pries

Foto: 1

Folgeseiten: 0