Biotopname Bruchwald südwestlich Stove		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table>															X				X			TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>-</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>		0	4	0	3	-	4	2	3	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table>		4	0	2	5
	X																																						
	X																																						
0	4	0	3																																				
-	4	2	3																																				
4	0	2	5																																				
Standort /Geologie anmoorige Grundmoränensenke		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>-</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table>		0	4	0	3	-	4	4	1																												
0	4	0	3																																				
-	4	4	1																																				
Naturraum 4 0 1		Westmecklenburgisches Hügelland mit Stepenitz und Radegast		Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"><tr><td></td><td></td><td>6</td></tr></table>				6	Bild-Nr. <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td></tr></table>		0	1	4	1																									
		6																																					
0	1	4	1																																				
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordwestmecklenburg		Gemeinde / Stadt Carlow		Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>					0	Größe in m <table border="1"><tr><td>7</td><td>4</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>		7	4	1	7																								
			0																																				
7	4	1	7																																				
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 30233				Größe in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Größe in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR 1 ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																					
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																			
Code W N R				B F X																																			
% 1 0 0																																							
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Erlenbruch																																							
Habitats + Strukturen		H D K	H D L	H Z R	H A O																																		
Beschreibung / Besonderheiten Kleiner Großseggen-Erlenbruch in einem Feldgehölz südlich Stove. Der sehr nasse bis überstaute Bruchwald steht auf Antorf bzw. Torf in einer Grundmoränensenke. Die Erlen sind mittelalt. Sie sind mehrstämmig. Kleinfächig grenzt im Norden und Süden Acker an.																																							
Wertbestimmende Kriterien																																							
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum				vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																			
Gefährdung																																							
							keine Gefährdung ☒																																
Empfehlung																																							

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 3 - 4 2 3 - 4 0 2 5

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Alnus glutinosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich
Carex elata
Ranunculus repens

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex riparia
Urtica dioica

Glechoma hederacea

Phalaris arundinacea

Pflanzenarten vereinzelt
Galium palustre

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 06.11.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Bauer

Foto: 1

Folgeseiten: 0