Biotopname Ried-Feuchtgebüsch-Komplex 1,2 km nordwestlich Klocksdorf		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X																					TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td><td>-</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>-</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td><td>8</td></tr> </table>		0	4	0	3	-	4	4	1	-	4	0	3	8	Biotop-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>3</td><td>8</td></tr> </table>		4	0	3	8
			X																																																									
0	4	0	3	-	4	4	1	-	4	0	3	8																																																
4	0	3	8																																																									
Standort /Geologie Senke/Verlandungsmoor+Quellbereich/kuppige Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						-								-								-																																		
				-																																																								
				-																																																								
				-																																																								
Naturraum 4 0 1		Westmecklenburgisches Hügelland mit Stepenitz und Radegast		Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>				7	Bild-Nr. <table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>8</td><td>7</td></tr></table>		0	1	8	7																																														
		7																																																										
0	1	8	7																																																									
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordwestmecklenburg		Gemeinde / Stadt Carlow		Größe in ha <table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>				0	3 4 0 7																																																			
		0																																																										
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 31128				min. Breite in m <table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																								
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR 1 FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																										
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																						
		Code V W N		V G R S K W		V G B V R W V Q R V R K V G S																																																						
		%		5 3 3 1 5		4 3 2 1 1																																																						
Vegetationseinheiten Erlen-Grauweidengebüsch, Uferseggenried, Steifseggenried, Wasserschwadenröhricht, Waldsimsen-Quellried, Flatterbinsen-Kleintröhricht, Sumpfreitgrasried																																																												
Habitats + Strukturen		D H M																																																										
Beschreibung / Besonderheiten Ried-Feuchtgebüsch-Komplex auf schwach meliorativ beeinträchtigten und ehemals extensiv bewirtschaftetem Verlandungsmoor mit randlichem Kleingewässer in Senke innerhalb der landwirtschaftlich genutzten, kuppigen Grundmoräne von Acker sowie kleinflächig Gehölzen und Staudenfluren umgeben. Auf sehr feuchten bis nassen, wenig gestörten Torfen und Antorf hat sich im Bereich eines ehemaligen Grabens ein Erlen-Grauweidengebüsch mit umgebendem Uferseggenried entwickelt. Kleinflächig konnten zudem randlich das Sumpfreitgrasried sowie das Waldsimsen-Quellried eines Quellbereiches auf sehr feuchtem Antorf beobachtet werden. Das Kleingewässer im Nordteil des Biotopes mit gut entwickeltem Wasserschwadenröhricht ist von einem schmalen Saum aus Steifseggenried und Flatterbinsen-Kleintröhricht umgeben, die in das sich großflächig anschließende Uferseggenried übergehen.																																																												
Wertbestimmende Kriterien																																																												
☐ Artenreichtum (Flora)						vielfältige Standortverhältnisse																																																						
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten						historische Nutzungsformen																																																						
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand						aktuelle Nutzung																																																						
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft						Flächengröße / Länge																																																						
☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops						Umgebung relativ störungsarm																																																						
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops						landschaftsprägender Charakter																																																						
☒ typische Zonierung von Biotoptypen						Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																						
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																																												
Gefährdung																																																												
Y W G						keine Gefährdung ☐																																																						
Empfehlung																																																												
Z S X																																																												

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 3 - 4 4 1 - 4 0 3 8

Substrat

k	g	
	g	Torf, wenig gestört
k		Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
k		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
		mesotroph
	g	eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
	g	feucht
	g	sehr feucht
	g	naß
k		offenes Wasser
k		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
	g	Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohllental

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
	g	aufgelassen
		keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
	g	Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
k		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex riparia Salix cinerea

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alnus glutinosa Calamagrostis canescens Carex acutiformis Glyceria maxima
 Mentha aquatica Salix pentandra

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Hottonia palustris Juncus effusus Lysimachia vulgaris Ranunculus aquatilis
 Rorippa amphibia

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 11.05.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Teppe

Foto: 1

Folgeseiten: 0