

Biotopname	"Ganow" im Züsower Forst westsüdwestlich Züsow				
Standort /Geologie	Senke/Gley Moor/Endmoräne				
Naturraum	Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 300				
Landkreis / Kreisfreie Stadt	Nordwestmecklenburg				
Gemeinde / Stadt	Benz Züsow				
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis	20757				
Schutzmerkmale	geschützt nach §20 LNatG M-V X				
Hauptcod.	Nebencode				
Code W N R	W F R W N E				
% 5 0	3 5 1 5				
Vegetationseinheiten					
Großseggen-Erlen-Bruchwald, Rasenschmielen-Erlen-Bruchwald, Nelkenwurz-Erlen-Bruchwald, Winkelseggen-Erlen-Eschenwald					
Habitats + Strukturen					
Beschreibung / Besonderheiten					
Meliorativ-beeinträchtigtes Gley Moor in Senke innerhalb der bewaldeten Endmoräne von Laubmischwald und Graben umgeben; Auf feuchtem bis sehr feuchtem Antorf stockt ein mittelalter Großseggen-Erlen-Bruchwald, der randlich in den Rasenschmielen- bzw. Nelkenwurz-Erlen-Bruchwald sowie in den Winkelseggen-Erlen-Eschenwald übergeht.					
Wertbestimmende Kriterien					
Artenreichtum (Flora)		vielfältige Standortverhältnisse			
Vorkommen seltener / typischer Tierarten		historische Nutzungsformen			
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		aktuelle Nutzung			
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		Flächengröße / Länge			
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		Umgebung relativ störungsarm			
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		landschaftsprägender Charakter			
typische Zonierung von Biotoptypen		Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion			
Struktur- und Habitatreichtum					
Gefährdung					
Y W S keine Gefährdung					
Empfehlung					
Z S X					

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10		Biotop-Nr.		
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g		
☐	☐	Torf, wenig gestört	☐	☐	dystroph	☐	☐	trocken	☐	☐
☐	☐	Torf, degradiert	☐	☐	oligotroph	☐	☐	mäßig trocken	☐	☐
☐	☒ g	Antorf	☐	☐	mesotroph	☐	☐	wechselfeucht	☐	☐
☐	☐	Sand	☐	☒ g	eutroph	☐	☐	frisch	☐	☐
☐	☐	Kies / Steine	☐	☐	poly- / hypertroph	☐	☒ g	feucht	☐	☐
☐	☐	Lehm	☐	☐		☐	☒ g	sehr feucht	☐	☐
☐	☐	Ton	☐	☐		☐	☐	naß	☐	☐
☐	☐	Halbkalk / Kalk	☐	☐		☐	☐	offenes Wasser	☐	☐
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm	☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐	gestörter Boden	☐	☐		☐	☐	quellig	☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐

Nutzungsintensität				Umgebung			
k	g	k	g	k	g	k	g
							Fließgewässer
							Stillgewässer
							Trockenbiotop
							Grünanlage / Kleingarten
							Weg
	g			g			Straße, Parkplatz
							Bahnanlage
							Gewerbe / Industrie
							Silo / Stallanlage
							Gebäude / Siedlung
							Spülfeld / Halde
				k			Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<u>Alnus glutinosa</u>	Carex acutiformis
------------------------	--------------------------

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Carex remota	Deschampsia cespitosa	Fraxinus excelsior	Geum rivale
Mentha aquatica			

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	<i>Dryopteris carthusiana</i>	<i>Urtica dioica</i>
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 09.12.1997	
	Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: IBS-Teppke	Foto: 1	Folgeseiten: 0