Biotopname "Grot Wisch" im Waldgebiet nordöstlich Pässe		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 4 0 5 - 2 1 1 - 4 0 6 2		Biotop-Nr.	
			X																																		
Standort /Geologie Senke/Versumpfungsmoor/Endmoräne		Anschluß in TK		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																	
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0		Luftbild-Nr.		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>4</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table>		1	4	1	1	4	1	Film-Nr.		Bild-Nr.																							
1	4	1																																			
1	4	1																																			
Landkreis / Kreisfreie Stadt Bad Doberan		Gemeinde / Stadt Satow Carinerland		Größe in ha		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table>					1	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td></tr> <tr><td>0</td><td>5</td><td>4</td><td>7</td></tr> <tr><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>		0	5	4	6	0	5	4	7	1	4	0	2												
			1																																		
0	5	4	6																																		
0	5	4	7																																		
1	4	0	2																																		
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 10506		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		Länge in m		min. Breite in m		max. Breite in m																													
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FIB ☐		NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐		ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																															
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																													
Code G F R W N R W F R V G R F G N								U M S																													
%																																					
Vegetationseinheiten Großseggen-Erlenwald, Wasserschwertlilien-Erlensumpf, Sumpfreitgras-Sumpfseggen-Ried, Seggen-Sumpfkatzdistel-Feuchtwiese																																					
Habitate + Strukturen																																					
Beschreibung / Besonderheiten Großes Versumpfungsmoor in Senke innerhalb der bewaldeten Endmoräne, das infolge Rodung und Mahd als Feuchtwiese mit zentralem Graben ausgebildet ist. Seggen-Sumpfkatzdistel-Feuchtwiese als dominierende Vegetationseinheit im Erlenbruch Bräunliche Sitter gefunden. Die überwiegend sehr feuchten Torfe sind wenig gestört.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener /typischer Tierarten ☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☒ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum					☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☒ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																
Gefährdung																																					
									keine Gefährdung ☒																												
Empfehlung																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 5 - 2 1 1 - 4 0 6 2

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐	k	Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm/Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly-/hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	k	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Strecksenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐	g	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐		keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐		Acker
☐	☐	g	Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver-/Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	g	Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐	g	Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	g	Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Alnus glutinosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex acutiformis

Cirsium palustre

Pflanzenarten ±zahlreich
Angelica sylvestris
Mentha aquatica

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex gracilis
Ranunculus repens

Iris pseudacorus

Lychnis flos-cuculi

Pflanzenarten vereinzelt
Aegopodium podagraria
Carex elongata
Cirsium oleraceum
Epipactis helleborine
Galium odoratum
Glechoma hederacea
Luzula multiflora
Phalaris arundinacea
Ranunculus ficaria

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Ajuga reptans
Carex oederi
Crataegus monogyna
Equisetum sylvaticum
Galium palustre
Juncus articulatus
Lycopus europaeus
Phragmites australis
Scrophularia nodosa
Betula pubescens
Carex panicea
Crepis paludosa
Fraxinus excelsior
Galium uliginosum
Juncus effusus
Milium effusum
Poa nemoralis
Sorbus aucuparia

Calamagrostis canescens
Chaerophyllum temulum
Deschampsia cespitosa
Galium aparine
Geum urbanum
Luzula campestris
Myosotis palustris
Potentilla anserina
Urtica dioica

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 21.06.1996

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Teppke

Foto: 2

Folgeseiten: 0