Biotopname Hochstaudenflur, NW Passin		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											X																											TK10 0 4 0 5 - 2 4 2 - 4 0 0 9		Biotop-Nr.	
			X																																								
Standort /Geologie Verlandungsmoor, vermoorte Senke in flachwelliger GM				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																							
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0				Luftbild-Nr. 2 2 7 - 0 1 5 3		Film-Nr.		Bild-Nr.																																			
Landkreis / Kreisfreie Stadt Güstrow		Gemeinde / Stadt Klein Belitz		Größe in ha		Länge in m		min. Breite in m																																			
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 03121				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		max. Breite in m		1 4 7 3																																			
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐		NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐		ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																					
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																							
Code V H F		V R W																																									
% 7 5		2 5																																									
Vegetationseinheiten Wasserdost-Mädesüß-Hochstaudenflur, Wasserschwadenröhricht																																											
Habitate + Strukturen																																											
Beschreibung / Besonderheiten - Aus einer nach 1990 aufgelassenen Feuchtwiese hat sich eine Hochstaudenflur und ein Wasserschwadenröhricht im nördlichen Bereich entwickelt, - große Teile sind mit Wasserschwaden und Rohrglanzgras bewachsen; dominant sind Wasserdost und Kleblabkraut, - Brennessel tritt zahlreich auf, an einigen Stellen breitet sich die Ackerkratzdistel aus, - vereinzelt wachsen Mädesüß, Kohldistel, Wald-Engelwurz (RLA-3), Gelbe Wiesenraute (RLA-2), Ackerhänsel, Sumpfkraatzdistel, Rauhaafiges Weidenröschen und Blutweiderich, - feuchter bis sehr feuchter Moorboden, - ein östl. Randgraben entwässert die Fläche.																																											
Wertbestimmende Kriterien																																											
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum					☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☒ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																						
Gefährdung Entwässerung																																											
Y W S								keine Gefährdung ☐																																			
Empfehlung Entwässerung einschränken																																											
Z S E																																											

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10
Biotop-Nr.

0	4	0	5	-	2	4	2	-	4	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Substrat

k	g	
	g	Torf, wenig gestört
k		Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
		mesotroph
	g	eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
	g	feucht
k		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
	g	Senke / Strecksenke
		Kerbtal
		Sohlentäl

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
	g	aufgelassen
		keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
	g	Weide
		forstliche Nutzung

Fischerei

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
k		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
	g	Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
	g	Graben

Fließgewässer

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

 Pflanzenarten dominant
 Eupatorium cannabinum

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Galium aparine

Glyceria maxima

 Pflanzenarten ±zahlreich
 Phalaris arundinacea

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Angelica sylvestris
 Cirsium palustre
 Galeopsis tetrahit
Thalictrum flavum

 Arctium lappa
 Cirsium vulgare
 Lythrum salicaria

 Cirsium arvense
 Epilobium hirsutum
 Phragmites australis

 Cirsium oleraceum
 Filipendula ulmaria
 Sonchus arvensis

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 08.07.1998

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: StAUNHRO-Radtke

Foto: 1

Folgeseiten: 0