Biotopname																TH	K10				В	ioto	p-Nr.
Feuchtwiese südlich des Stadtmoores								)	Χ				0 4 0 5			<b>]</b> -	- 4 2		-	4	0	0 7	
													]		Ar	schl	uß i	n TK		_			
										T			1										
	/Geologie									$\top$													
vermoorte Senke/Beckensandgebiet										1			† [										
Naturraum Warnow- und Recknitztal mit Güstr							und	l Bi	itzow	ver	Bec	ken						Fil	m-Nr.	_		Bild	·Nr.
3 0		w dia ito	CKITIZIAI		Gustiower und Butzower Becker					Luftb	Luftbild-Nr. 1			8 6	<u>;</u> -	0	0	4 0					
		<u> </u>			T											_ -							
	s / Kreisfreie	Stadt		- 1	Gemeinde / Stadt Bützow, Stadt							Größe in ha				) ,	4	4	5 3				
Güstrov	1				Suizo	w, 31	laul						Läng	je in	m								
16.1 No. 1-	D'-1				-						min. Breite in m												
	n Biotopverz	eicnnis		_										max. Breite in m , , , berwiegend 3 - zum geringen Teil									
05070								$\neg$	1 - v	olls			überwi ∃	eger			geri	ngen	Teil			[	<b>-</b>
Schutzm	erkmale			,			LP	$\dashv$			FNI		-			IP	_					FiB	_
	t nach §20 LN	latG M-V	X		NSG			$\dashv$	LSG		BR			_	14/-1		FFH-Geb.						
						N	ND				GL	3			Fr	ηB		V					$\perp$
	Hauptcod.	Nebenco	de																Ü	berla	ager	ung	scode
Cod	e G <sub> </sub> F <sub> </sub> M	V <sub> </sub> G <sub> </sub> R	G <sub> </sub> F	F	$M \mid S$	T	FΙ	GΙ	N										U	$\mid$ M	V	U	$M \mid D$
-	%   3 <sub> </sub> 0	2   5	2	0	_   2	0			5														
	onseinheiten										•												
Bestande	der Wiesens	segge, Kam	mseggen	ried, r	Kriech	nanne	entul	s-Kr	rechs	trau	uisgra	ıs-Flu	trasen	Scr	inabe	elseg	genr	ied					
Hahitato	+ Strukturen	<u> </u>																					
Tiabitate	TOTIUNTUICI													-									$\dashv$
Pacabra	ibung / Beso	n dorboiton																		Щ		ш	$\perp$
Der Bioto	p befindet sid	ch westlich	eines Tor	fstiche	es in c	desse	n Ve	erlan	ndung	sbe	ereich	und	wird a	us ei	nem	Mosa	aik v	on B	estän	den (	der		
Wiesens	egge, Kamms ird im Süden (	seggenried, durch einen	und Schi	nabels	segge	nried	gebi	ldet	, die	dur m C	ch Kr Prabe	iechh	ahnen	fußfl	utras	en er	ng m	iteina	ander	verz	:ahnt	sinc	l. Der
Iris.	ila ilii Gaacii (	daron cinci	Clabell	201301	millor	ı unu	CITEM	vasc	ocit. ii	<	Jiabe	ii bci	macra	iiCii i	COLLIN	COLOCI	11, 131	орсі	iseggi	J, Ol	CIIGO	ggc	unu
ı																							
Worthos	timmende Kr	itorion																					
										1.	vicit?	ltics (	Ston-I-	ph .c	الماقاة	iocs							
	Artenreichtum (Flora)								vielfältige Standortve														
Vorkommen seltener / typischer Tierarten									-	historische Nutzungsformen													
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand									<u> </u>	aktuelle Nutzung													
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge													
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										Umgebung relativ störungsarm													
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops									landschaftsprägender Charakter														
typische Zonierung von Biotoptypen									Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion														
Struktur- und Habitatreichtum																							
Gefährdung																							
	-																						
												_											
$Y_{\parallel}W_{\parallel}$	≣				L		I											k	eine C	efär	ırdur	ng	
Empfehl	ung																						
7 9	=																						

STANDORTMERKMALE	( k - kleinflächig, g - groß	flächig)		TK10	Biotop-Nr.							
	,	•,	0 4 0	5 - 4	2 2 - 4 0 0 7							
Substrat k g	Trophie W k g	<b>/asserstufe</b> k g	<b>Relief</b> k g		Exposition k g							
g Torf, wenig gestört	dystroph	trocken	eben		N g							
Torf, degradiert	oligotroph	mäßig trocken	wellig	9	NO							
Antorf	g mesotroph	wechselfeucht	kuppi	ig	О							
Sand	eutroph	frisch	dünig	)	so							
Kies / Steine	poly- / hypertroph	feucht	Berg	Berg / Rücken S								
Lehm		sehr feucht	Riede	el	sw							
Ton		g naß	Flach	Flachhang <= 9° W								
Halbkalk / Kalk		offenes Wasser	Steilh	Steilhang > 9° NW								
Schlamm / Faulschlam	nr		Nisch	Nische								
		quellig	g Senk	Senke / Strecksenke								
gestörter Boden			Kerbt	Kerbtal								
			Sohle	Sohlental								
NUTZUNGSMERKMALE	( k - kleinflächig, g - groß			k g								
Nutzungsintensität k g	k g	<b>Umgebung</b> k g			Fließgewässer							
intensiv	Fischerei	Acker / Gart	tenbau	g	Stillgewässer							
g extensiv	Angeln	Ackerbrache	е		Trockenbiotop							
aufgelassen	Erholung	Grünland. ir	ntensiv		Grünanlage / Kleingarten							
keine Nutzung	Kleingartenbau	g Grünland, e	xtensiv		Weg							
	Erwerbsgartenbau	Laub- / Miso	chwald		Straße, Parkplatz							
Nutzungsart	Ferienhäuser	Nadelwald			Bahnanlage							
k g	Bodenentnahme	Feuchtwald	/ -gebüsch		Gewerbe / Industrie							
Acker	Verkehr	Gehölz			Silo / Stallanlage							
g Wiese	Ver- / Entsorgungs	sanlage Röhricht / F	euchtbrache		Gebäude / Siedlung							
Weide	sonstige Nutzung:	Hochstaude	en / Ruderalflu	ır	Spülfeld / Halde							
forstliche Nutzung		Graben		Bodenentnahme								
Pflanzenarten dominant ( u Carex nigra	unterstrichen: Art der Roten Liste <u>Carex rostrata</u>	e MV, fett: Art der BArtSchV)										
Pflanzenarten ±zahlreich ( Agrostis stolonifera	unterstrichen: Art der Roten Liste Carex disticha	e MV, fett: Art der BArtSchV)										
Agrodio dolonilota <u>Datox distinta</u>												
Pflanzenarten vereinzelt ( Cardamine pratensis	unterstrichen: Art der Roten Liste Carex elata	e MV, fett: Art der BArtSchV )  Carex paniculata		Fauisetur	m palustre							
Galium palustre	Glyceria fluitans	Iris pseudacorus		Juncus a	rticulatus							
Juncus effusus Ranunculus repens	Lathyrus pratensis Scirpus sylvaticus	Phalaris arundinacea Typha latifolia	а	Ranuncul	lus acris							
Translational Topons	Conpus syrvanous	Typha lationa										
Angaben zur Fauna												
Verwendete Unterlagen			С	Datum erste	Begehung: 10.05.1999							
Design Control Control	- de de d			Datum letzte								
Bearbeiter/in: StAUNHRO-He	entschei		F	oto: 1	Folgeseiten: 0							