| Bio | topnam | | | | | | | | | | | | | | | ΤK | 10 | | | | Е | ioto | p-Nr | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|------|----------------|------|---|
| "Kirchmoor" westlich von Sagsdorf | | | | | | | | | Γ | | | | | | 0 | 4 | 0 | 5 | - [| 4 | 3 1 | 7. | - 4 | 0 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Anschlu | | | | ΤK | | _ | | | | |
| | | | | | | | | | T | | X | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | Geologie | | | | | | | T | | | | | | | | | | - | | | _ | | | | |
| deg | gradiert | tes Kesselr | moor/Sand | ler | | | | | | | | | | | | | | | - [| | | | | | | |
| Nat | urraum | Sternhe | erger Seen | achiet | | | | | | | - | | | | | | | | | Filn | n-Nr. | | | Bild | Nr. | |
| 4 | 0 3 | gebiet | | | | | | | | | | Luft | bild- | Nr. | | | | 1 | 3 7 | 3 7 - 0 6 8 8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | ╝- | | | | |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | | | | | | Gemeinde / Stadt Sternberg, Stadt | | | | | | | Grö | ße ii | n ha | а | | | | (| <u>)</u> , | 9 | 1 | 5 | 5 | |
| Ра | rchim | | | | St | ernbe | erg, S | stadt | Ī | | | | | Län | ge ir | n m | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | | | | | min. Breite in m | | | | | | | | | | | | | |
| | | Biotopverze | eichnis | | | | | | | | | | | | max. Breite in m | | | | | | | | | | | |
| 028 | 376 | | | | 1 - vollständig 2 - ü | | | | | | | überwiegend 3 - zum geringen Teil | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-1 | 4 | d-marks | | | | | NLF | · | | | F | ND | | | | | NP | ' <u> </u> | | | | | | FiB | | |
| | nutzmer | r kmale lach §20 LNa | atG M-\/ | X | NSG | | | | LSG | | | | i | BR | | | | | | | | FFH-Geb. | | | | |
| gos | CHULZITI | acii gzo Livi | ato IVI-V | | ND | | | | | GLB | | | FnB | | | | W | /ald-1 | d-Totalreservat | | | | | | | |
| | | Hauptcod. | Nebencod | е | | | | | | | | | • | | | | | | | Ü | Überlagerungscode | | | | le | |
| | Code | V ₁ W ₁ N | MISIW | V W D | MISITSI | | | | ı A | ١ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % | 1610 | 11 15 | 1 1 5 | ļ | | 5 | | 1 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver | | | 0 | 0 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gra Tor | Vegetationseinheiten Grauweiden-Feuchtgebüsch, Torfmoos-Pfeifengras-Birken-Gehölz, Torfmoos-Flatterbinsen-Birken-Gehölz, Torfmoos-Birken-Grauweiden-Gebüsch, Rispengras-Birken-Grauweiden-Gebüsch, Torfmoos-Sumpfreitgras-Schilf-Röhricht, Fadenseggen-Ried | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hal | nitato ± | Strukturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Idi | Jitate + | Otraktaren | | | | | | | | | | _ | | | + | | | | | | | | | H | | |
| | | ung / Beson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fac Tor der | lensegg fmoos-C Anteil a | je und Pfeife Grauweiden- in entwässe | engras verge Gebüsche arten Grauwe | orfstiches is esellschaftet an, die aber eidengebüsc vald den Biot | . So balc hen | wohl in eu | dem [.] troph | Torfn e Gr | noc auv | s-Bir veide | ken- en-G | Gel ebü | nölz : sche | als au über | ich d gehe | dem en. | Tor Im M | moc littelt | s-S eil d | chilf- des E | -Röhi Biotop | richt oes | schl | ießer bei a | sicl | n |
| Wo | rthoetin | nmende Kri | torion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ichtum (Flor | | | | | | | | | vielfältige S | | | | tandortverhältnisse | | | | | | | | | \dashv | | |
| | | | | | | | | | | | - | | Nutzungsformen | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | nmen seltene r / gefährdet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | | aktuelle Nu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | | | | | | | | | | | Flächengröße / Länge | | | | | | | | | | | | | | | |
| natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | | | | | | | | | | | Umgebung relativ störungsarm | | | | | | | | | | | | | | | |
| gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | | | | | | | | | | | landschaftsprägender Charakter | | | | | | | | | | | | | | | |
| typische Zonierung von Biotoptypen | | | | | | | | | | | Tri | rittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion | | | | | | | | | | | | | | |
| Struktur- und Habitatreichtum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Υ | Gefährdung Y W G keine Gefährdung Empfehlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | S E | | | |] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STANDORTMERKMALE | | | (| k - ł | deinflächig, g - groß | | | Т | K10 | | | _ | ioto | p-Nr. | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------|--------|------------------|---------------------|---------|------------|-------|--------|--|
| Substrat | | | Trophie V | | | asse | ereti | ıfe | | 0 4 0 5 | | | | | | 4 Sitio | 4 3 | | |
| k g | | k g | | , ** | Wassers k g | | | k g | | | | | _ | Exposition k g | | | | | |
| k | | Torf, wenig gestört | | | dystroph | | | trocken | | g | eben | | | | | | N | | |
| | g | Torf, degradiert | | L | oligotroph | | | mäßig trocken | | | wellig | | | | | | NO | | |
| | | Antorf | k | | mesotroph | | | wechselfeucht | | | kuppig | | | | | | 0 | | |
| | | Sand | | g | eutroph | k | | frisch | | | dünig | | | | | | so | | |
| | | Kies / Steine | poly- / hypertroph | | | k | | feucht | | | Berg / F | Rück | ken | S | | | | | |
| | | Lehm | | | | | g | sehr feucht | | | Riedel | | | | | | | | |
| Ton | | | | | | | g | naß | | | Flachha | - | | D | | | W | | |
| Halbkalk / Kalk | | | | | | k | | offenes Wasser | | | Steilhar | ng > | . 9° | | | | NW | | |
| Schlamm / Faulschlan | | | nr | | | | | 1 | | | Nische | | | | | | | | |
| | | | | | | | | quellig | | g | Senke / | | ecks | enke | | | | | |
| gestörter Boden | | | | | | | | | Kerl | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sohlent | tal | | | | | | | |
| | | UNGSMERKMALE | (| k - l | kleinflächig, g - groß | fläch | ig) | Haranah uman | | | | k | g | | | | | | |
| | g | gsintensität | k | g | | | | Umgebung k g | | | | | | Fließge | ewäs | sser | | | |
| | | intensiv Fischerei | | | | | | Acker / Gar | Acker / Gartenbau | | | | | Stillge | ewässer | | | | |
| | | extensiv | | | Angeln | | | Ackerbrach | ie | | | | | Trocke | enbio | top | | | |
| | | aufgelassen | | | Erholung | | | Grünland. i | nten | siv | | | | Grünaı | nlage | e/K | leing | jarten | |
| | g keine Nutzung Kleingartenbau | | | | | | | Grünland, e | exte | nsiv | | | | Weg | | | | | |
| | | | | | Erwerbsgartenbau | | | g Laub- / Mis | chw | ald | | | | Straße, Parkplatz | | | | | |
| Nutzungsart | | | Ferienhäuser | | | | | Nadelwald | | | | | | Bahnanlage | | | | | |
| k g | | | Bodenentnahme | | | | | Feuchtwald | d / -g | jebü | sch | | | Gewerbe / Industrie | | | | | |
| | | Acker | | | Verkehr | | | Gehölz | | | | | | Silo / Stallanlage | | | | | |
| Wiese Ver- / Entsorgungsa | | | | | | anla | ge | Röhricht / F | euc | htbr | ache | | | Gebäu | j | | | | |
| Weide sonstige Nu | | | | sonstige Nutzung: | | | Hochstaude | en / | Rud | eralflur | | | Spülfeld / Halde | | | | | | |
| forstliche Nutzung | | | | | | | | Graben | | | | | | Bodenentnahme | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Salix cinerea Sphagnum fimbriatum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sans onerea Spriagrium impriatum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | narten ±zahlreich (u pubescens | unters | | en: Art der Roten Liste Irex lasiocarpa | MV, | fett: | Art der BArtSchV) Juncus effusus | | | | Mali | nio o | aerulea | | | | | |
| | | mites australis | | | a trivialis | | | Julicus ellusus | | | ľ | VIOIII | IIIa G | aeruiea | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Calamagrostis canescens Marchantia polymorpha Salix aurita Sphagnum palustre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | agrostis canescens latifolia | | Ma | archantia polymorph | a | | Salix aurita | | | ٤ | Sph | agnu | ım palı | ustre | • | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| An | gabe | n zur Fauna | | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/0 | rwen. | dete Unterlagen | | | | | | | | | Dot | lim 1 | areta | Begehur | na. | 10.0 | 2 20 | 100 | |
| ve | WEI | uete Unterlayen | | | | | | | | | | | | Begehu | | 10.0 | z.20 | UU | |
| Be | arbei | ter/in: IBS-Dubbert | | | | | | | | | Foto | | 3 | | | Folg | gesei | ten: 0 | |