Biotopname Degradiertes Sauer-Zwischenmoor südlich "Wustrowsee"		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>												X						TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr> </table>		0	4	0	5	4	3	3	4	0	2	0
		X																														
0	4	0	5																													
4	3	3																														
4	0	2	0																													
Standort /Geologie Verlandungsbereich Wustrowsee im Überg. zu Hochflächensanden				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																												
Naturraum Sternberger Seengebiet 4 0 3				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>1</td><td>7</td><td>5</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>9</td></tr> </table>		1	7	5	0	2	6	9																				
1	7	5																														
0	2	6	9																													
Landkreis / Kreisfreie Stadt Parchim		Gemeinde / Stadt Sternberg, Stadt		Bild-Nr. Größe in ha <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table> , <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td></tr> </table>					1	5	6	8	8																			
			1																													
5	6	8	8																													
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 03241				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> FND <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> NP <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> FiB <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> NSG 1 LSG 1 BR <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> FFH-Geb. <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> ND <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> GLB <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> FnB <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table> Wald-Totalreservat <table border="1" style="width: 30px; height: 20px;"></table>																												
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																										
Code M S P		V W N		V W D		M S T																										
% 6 3		3 0		5		2																										
Vegetationseinheiten Flatterbinsen-Sumpfhaarstrang-Wiesenseggen-Staudenflur, Flutschwaden-Grauweiden-Feuchtgebüsch, Rispengras-Grauweiden-Feuchtgebüsch, Rasenschmielen-Grauweiden-Gebüsch, Ried des Schmalblättrigen Wollgrases																																
Habitate + Strukturen D H M																																
Beschreibung / Besonderheiten Im Verlandungsbereich des Wustrowsees hat sich in einer nach Norden zum See hin offenen Nische ein Feuchtbiotopkomplex entwickelt. Auf den überwiegend sehr feuchten gestörten und ungestörten, mesotrophen bis eutrophen Torfen dominiert eine Flatterbinsen-Sumpfhaarstrang-Wiesenseggen-Staudenflur, welche als Degradationsstadium eines mesotroph-sauren Moores codiert wurde. Nur sehr vereinzelt treten Torfmoose auf. Im Zentrum des Biotopes befindet sich auch kleinflächig ein Ried des Schmalblättrigen Wollgrases. Ansonsten ist die Staudenflur mosaikartig mit Grauweidengebüschen verzahnt. Bei letzteren überwiegen Feuchtgebüsche mit Flutschwaden bzw. Gemeinem Rispengras, aber auch entwässerte Grauweidengebüsche mit Rasenschmielen treten auf. Der Biotop grenzt im Westen an Laubwald, im Südosten an Nadelwald, im Osten an Ruderalflur und im Norden an den Gehölzsaum des Sees (Luftbildcode).																																
Wertbestimmende Kriterien																																
Artenreichtum (Flora)				vielfältige Standortverhältnisse																												
Vorkommen seltener / typischer Tierarten				historische Nutzungsformen																												
☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				aktuelle Nutzung																												
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				Flächengröße / Länge																												
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				Umgebung relativ störungsarm																												
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				landschaftsprägender Charakter																												
typische Zonierung von Biotoptypen				Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																												
Struktur- und Habitatreichtum																																
Gefährdung																																
							keine Gefährdung ☒																									
Empfehlung																																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 5 - 4 3 3 - 4 0 2 0

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	g	Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐	g	mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	k	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐	g	Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐	g	Laub- / Mischwald
☐	☐	g	Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	k	Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	g	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex nigra Salix cinerea

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Eriophorum angustifolium Juncus effusus Peucedanum palustre Poa trivialis

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Betula pubescens Calamagrostis canescens Carex paniculata Cirsium oleraceum
Cirsium palustre Deschampsia cespitosa Eupatorium cannabinum Glyceria fluitans
Lysimachia thyrsoflora Pinus sylvestris Ranunculus repens Salix aurita
Sphagnum fimbriatum

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 21.12.1999

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Pries

Foto: 2

Folgeseiten: 0