Biotopname Torfmoos-Birken-Gehölz östlich von Pastin		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								X	X																													TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>		0	4	0	5	4	4	3	4	0	0	2
X	X																																																			
0	4	0	5																																																	
4	4	3																																																		
4	0	0	2																																																	
Standort /Geologie Kesselmoor/Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
Naturraum Krakower Seen- und Sandergebiet				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>8</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>8</td></tr> </table>		1	8	6	0	0	9	8																																								
1	8	6																																																		
0	0	9	8																																																	
<table border="1"> <tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>		4	1	1			Bild-Nr. Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>8</td></tr> </table>					1	2	6	2	8																																				
4	1	1																																																		
			1																																																	
2	6	2	8																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Parchim		Gemeinde / Stadt Sternberg, Stadt		Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 04035		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NP <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FiB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NSG <table border="1"><tr><td></td></tr></table> LSG <table border="1"><tr><td></td></tr></table> BR <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FFH-Geb. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> ND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> GLB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FnB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Wald-Totalreservat <table border="1"><tr><td></td></tr></table>																																																		
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																				
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																
Code M S W		V W N		U M L																																																
% 5 4		2 4																																																		
Vegetationseinheiten Sumpfcalla-Torfmoos-Grauweiden-Birken-Gehölz, Torfmoos-Wiesenseggen-Birken-Gehölz, Torfmoos-Schnabelseggen-Birken-Gehölz, Torfmoos-Sumpffhaarstrang-Sumpflblutaugen-Grauweiden-Birken-Gehölz, Torfmoos-Flatterbinsen-Sumpfreitgras-Birken-Gehölz,																																																				
Habitate + Strukturen																																																				
Beschreibung / Besonderheiten weitere Veg.-einheiten: Torfmoos-Grauweiden-Gebüsch, Walzenseggen-Grauweiden-Gebüsch, Wasserfeder-Steifseggen-Grauseggen-Gebüsch, Sumpfcalla-Grauweiden-Ohrweiden-Gebüsch, Spitzmoos-Sumpffarn-Grauweiden-Gebüsch, Torfmoos-Grauseggen-Sumpfreitgras-Birken-Bruchwald, Torfmoos-Wollgras-Birken-Gehölz, Pfeifengras-Birken-Moorwald Am Westrand eines kleinen Waldgebietes innerhalb einer Senke hat sich ein mesotroph-saures Kesselmoor entwickelt, das auch zahlreiche eutrophe, nach Abtorfung sekundär versumpfte Bereiche aufweist. Trotz Abtorfung und Entwässerung (zahlreiche Binnengräben queren den Moorstandort und münden in einen das Moor nach Osten verlassenden Hauptgraben) dominieren Gehölzstadien des Sauer-Zwischenmoores. Den Gehölzbestand bestimmt die Moorbirke, vereinzelt auch mit Grauweide vergesellschaftet. Die Bodenvegetation prägen neben einer dichten Torfmoosdecke auch Schnabelsegge, Wiesensegge, Sumpffhaarstrang, Sumpflblauge und im Südteil auch Flatterbinse und Sumpfreitgras. Auch Sumpfcalla nimmt bereichsweise einen hohen Anteil ein. Sie bildet u. a. auch die Krautschicht der nassen Grauweiden-Ohrweiden-Gebüsche, die im NW-Teil abgetorfte Senken besiedeln. Abtorfungen finden sich auch am Ostrand, so daß hier ein breiter Randsumpf ausgebildet ist, der von Wasserfeder-Steifseggen-Grauweiden-Gebüsch und Walzenseggen-Grauweiden-Gebüschen besiedelt wird, die weiter nach Westen in Torfmoos-Grauweiden-Gebüsche und Spitzmoos-Sumpffarn-Grauweiden-Gebüsche übergehen (teilweise unterbrochen von nicht abgetorften von Pfeifengras-Birken-Moorwald eingenommenen Balken). Am Nord- und Westrand ist der Randsumpf nur schmal, kleinflächig (im Westen) stockt mesotropher Torfmoos-Grauseggen-Sumpfreitgras-Birken-Bruchwald in diesem Bereich. Oligotrophe Nährkraftverhältnisse herrschen im Zentrum des Kesselmoores, wo die Torfmoosdecke von Bulten des Scheidigen Wollgrases unterbrochen wird. Vom Acker im Westen trennt den Biotop ein Gehölzstreifen, ansonsten grenzt er an Laubwald.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
X	Artenreichtum (Flora)	vielfältige Standortverhältnisse																																																		
	Vorkommen seltener / typischer Tierarten	historische Nutzungsformen																																																		
X	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	aktuelle Nutzung																																																		
	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	Flächengröße / Länge																																																		
	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	Umgebung relativ störungsarm																																																		
	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	landschaftsprägender Charakter																																																		
	typische Zonierung von Biotoptypen	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																		
	Struktur- und Habitatreichtum																																																			
Gefährdung																																																				
Y	W	E				keine Gefährdung ☐																																														
Empfehlung Hauptgraben am Ostrand verschließen																																																				
Z	S	X																																																		

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 5 - 4 4 3 - 4 0 0 2

Substrat

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	k	Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie

☐	☐	k	dystroph
☐	☐	k	oligotroph
☐	☐	g	mesotroph
☐	☐	k	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe

☐	☐	k	trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	k	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief

☐	☐	k	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition

☐	☐	k	N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	k	intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

Nutzungsart

☐	☐	k	Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

☐	☐	k	Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	k	Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐	g	Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	g	Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

☐	☐	k	Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Betula pubescens

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Sphagnum fallax

Sphagnum palustre

Pflanzenarten ±zahlreich
Agrostis canina
Carex nigra
Juncus effusus
Potentilla palustris
Sparganium erectum

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Calamagrostis canescens
Carex rostrata
Lemna minor
Rorippa palustris
Sphagnum fimbriatum

Calla palustris
Eriophorum vaginatum
Lysimachia thyriflora
Salix aurita
Sphagnum squarrosum

Calliergonella cuspidata
Galium palustre
Molinia caerulea
Salix cinerea
Thelypteris palustris

Pflanzenarten vereinzelt
Aulacomnium palustre
Carex lasiocarpa
Lycopus europaeus
Phragmites australis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex canescens
Dryopteris carthusiana
Lysimachia vulgaris
Scutellaria galericulata

Carex elata
Hottonia palustris
Lythrum salicaria
Solanum dulcamara

Carex elongata
Iris pseudacorus
Peucedanum palustre

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 17.08.1999

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Dubbert

Foto: 2

Folgeseiten: 0