Biotopname																			тк	10				ı	Bioto	p-Nr	·.
Feuchtwiese auf Halbinsel im "Bolzer Se					е"				Γ						0	4	0	5	-	4	4	4	- 4	0	0	3	
															Anschluß i				ıß i	n TK		_					
										T			Х							-							
		Seologie																				_					
Seehalbinsel/Grundmoräne																				-							
Naturraum Krakower Seen- und Sanderge																					Fil	m-N	r.		Bild	-Nr.	
4 1 1						goo	Jenier							Luftbild-Nr. 1 7				7	5	- 0	2	8	4				
																			-								
Land Parc		/ Kreisfreie	Stadt			Gemeinde / Stadt Mustin						Größe in ha						0	, 0	7	2	5					
raic						Wustin						Länge in m						,									
164 PI	. : F	Dietenvers	iahnia			1									min. Breite in m					_	\dashv	,	-				
0427		Biotopverze	eiciiiis			4							max. Breite in m								\dashv						
0421	0					NLP FND							überwiegend 3 - zum geringen To					ren			FiB						
Schu	tzmer	kmale			7	NSG ND							1	BR			+				EEH-						
gesch	nützt n	ach §20 LN	atG M-V	X						+	LSG GLB				FnB			+	١/	Vold	FFH-Geb.						
					ואט						GLD			LIID				V		Überlagerungscode				-			
<u> </u>		Hauptcod.	Nepenco	ae		1								1								- '	Jbe	riage	rung	sco	de
(Code	$G_{ F R}$			1																						
	%	1 0 0			1																						_
		seinheiten terich-Zweiz	eilenseaa	en-Feuch	twic	co 9	chilf.	-Sumr	ofeen	100	n-Fai	ıchtw	ioca														
vvass	CIKIIO	torion-Zwoiz	cherisegg	CITT CUCI	LVVIC.	30, C)CI IIII	Curry	Jiscy	igc	,,,,,,	JOHEV	1030	,													
Habit	ate +	Strukturen			1		1		1	1		1 1			l I		1	1			1						
		1 1	1 1																								
Besc	hreibu	ung / Beson	derheiter	1	1																						
Grau	weider	n-Gebüsch a	an.																								
		nmende Kri										_															_
		ichtum (Flor										vielfältige Standortverhältnisse															
V	Vorkommen seltener / typischer Tierarten									historische Nutzungsformen																	
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand										aktuelle Nutzung																	
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge																	
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops									Um	geb	ung	relat	iv st	öru	ngsa	rm											
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops									landschaftsprägender Charakter																		
typische Zonierung von Biotoptypen										Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																	
Struktur- und Habitatreichtum																											
Gefährdung																											
Empf	ehlun	g							I												k	eine	Gef	fährdu	ing	X	

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - groß	sflächig)		TK10	Biotop-Nr.				
Substrat	Trophie W		0 4 0 Relief	5 - 4 4	Exposition				
Torf, wenig gestört Torf, degradiert g Antorf Sand Kies / Steine Lehm Ton Halbkalk / Kalk Schlamm / Faulschlam gestörter Boden NUTZUNGSMERKMALE Nutzungsintensität k g intensiv extensiv aufgelassen keine Nutzung Nutzungsart k g Acker g Wiese Weide forstliche Nutzung	dystroph oligotroph mesotroph eutroph poly-/hypertroph mr	trocken mäßig trocken wechselfeucht frisch g feucht sehr feucht naß offenes Wasser Umgebung k g Acker / Garte Ackerbrache Grünland. int g Grünland, ex Laub - / Misch Nadelwald k Feuchtwald / Gehölz sanlage g Röhricht / Fe	k g g eben wellig kupp dünig Berg Ried Flach Steill Nisch Senk Kerb Sohle enbau etensiv ktensiv hwald / -gebüsch	g ig g / Rücken el nhang <= 9° nang > 9° ne ke / Strecksenl tal ental k g Fl St St GG GG GG GG GG GG GG	k g N NO O SO SS SW W NW				
Pflanzenarten dominant Carex districha (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Pflanzenarten ±zahlreich Carex acutiformis Trifolium repens Pflanzenarten vereinzelt Agrostis stolonifera Potentilla anserina Taraxacum officinale (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Juncus inflexus Ranunculus acris Ranunculus repens Oxalis acetosella Ranunculus repens Rumex acetosa Angaben zur Fauna									
Verwendete Unterlagen Bearbeiter/in: IBS-Pries			1	Datum erste Beg Datum letzte Be Foto: 1	gehung: 16.07.2000 egehung: Folgeseiten: 0				
= ===================================			,	J.U.	1. 3.93301011. 0				