Biotopname Feuchtwiese, 500 m südlich Brookhusen		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																X																TK10 0 4 0 6 - 1 1 2 - 4 0 1 3		Biotop-Nr.	
		X																																			
Standort /Geologie Feuchtgrünland in Beckenlage,Verlandungsmoor,Grundmoräne		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Luftbild-Nr. 1 4 1 - 0 4 9 2		Bild-Nr. 0 4 9 1																			
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0		Gemeinde / Stadt Benitz Ziesendorf		Größe in ha Länge in m min. Breite in m max. Breite in m		Film-Nr. 1 4 1																															
Landkreis / Kreisfreie Stadt Bad Doberan		ifd. Nr. im Biotopverzeichnis 11439		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		FIB FFH-Geb. Wald-Totalreservat																															
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FIB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																			
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																	
Code G F R V G R				U M V																																	
% 7 0		3 0																																			
Vegetationseinheiten Sumpfdotterblumen- Feuchtwiese, Sumpfschilfried																																					
Habitate + Strukturen																																					
Beschreibung / Besonderheiten -Die Feuchtwiese grenzt unmittelbar an einen Bruchwald und ist Teil eines Grünlandkomplexes;-ehemals ein entwässertes Verlandungsmoor, -der Boden ist überwiegend naß und moorig; einige nasse Flächen sind bei der Mahd ausgespart, -neben Sumpfschilf und Sumpfdotterblume treten weitere Seggenarten, Hahnenfußarten und Sumpflabkraut häufig auf, -zum Teich hin soll Breitblättriges Knabenkraut wachsen.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
☒	Artenreichtum (Flora)			☐	vielfältige Standortverhältnisse																																
☐	Vorkommen seltener /typischer Tierarten			☐	historische Nutzungsformen																																
☒	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand			☒	aktuelle Nutzung																																
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft			☐	Flächengröße / Länge																																
☐	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops			☐	Umgebung relativ störungsarm																																
☒	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops			☐	landschaftsprägender Charakter																																
☐	typische Zonierung von Biotoptypen			☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																
☐	Struktur- und Habitatreichtum			☐																																	
Gefährdung																																					
							keine Gefährdung ☒																														
Empfehlung																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 6 - 1 1 2 - 4 0 1 3

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐	k	Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm/Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly-/hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	k	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Strecksenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐	g	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐		keine Nutzung

Nutzungsart

☐	☐		Acker
☐	☐	g	Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver-/Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐	g	Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐	k	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtblache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex acutiformis Ranunculus acris

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alopecurus pratensis Calamagrostis canescens Caltha palustris Carex disticha
Carex elata Carex riparia Cirsium oleraceum Galium palustre
Glecoma hederacea Ranunculus repens

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Ajuga reptans Anthriscus sylvestris Cardamine pratensis Deschampsia cespitosa
Epilobium hirsutum Galeopsis tetrahit Galium aparine **Iris pseudacorus**
Juncus articulatus Juncus effusus Lathyrus pratensis Ranunculus ficaria
Urtica dioica

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 21.05.1996

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: StAUNHRO-Radtke

Foto: 1

Folgeseiten: 0