Biotopname Erlenbruchwald im Hagenholz		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															X																							TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr> </table>		0	4	0	6	3	1	1	4	0	1	6
	X																																																			
0	4	0	6																																																	
3	1	1																																																		
4	0	1	6																																																	
Standort / Geologie vermoorte Senke/Beckensandgebiet		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
Naturraum Warnow- und Recknitztal mit Güstrower und Bützower Becken		Film-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>7</td></tr> </table>		1	3	7	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>6</td></tr> </table>		1	0	8	6																																								
1	3	7																																																		
1	0	8	6																																																	
<table border="1"> <tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>		3	0	1	Luftbild-Nr.		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																													
3	0	1																																																		
Landkreis / Kreisfreie Stadt Güstrow		Gemeinde / Stadt Bützow, Stadt Dreetz		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2</td><td>6</td></tr> </table>								2	6																																							
		2	6																																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 09707		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☒ 1 FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																				
Hauptcod.		Nebencode																																																		
Code W N R		W N Q		S T R																																																
%		%		%																																																
5 4		3 2		8 5 1																																																
		Überlagerungscode																																																		
		U M Q																																																		
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Erlen-Bruchwald, Johannisbeer-Erlen-Eschen-Quellwald, Schilf-Erlen-Quellwald, Torfstich, Graben, Wirtschaftsweg unversiegelt																																																				
Habitats + Strukturen																																																				
H S O H Z I H M S H T B H A J H A A H N N																																																				
Beschreibung / Besonderheiten Der Biotop ist Bestandteil eines großen Waldkomplexes und liegt in einer Senke. Ein Grabensystem entwässert den Biotop. Der nördliche Teil des Biotopes wird von einem lichten jungen Erlenwald mit Niederwaldnutzung gebildet. Der Biotop wird mosaikartig aus einem Johannisbeer-Erlen-Eschen-Quellwald, Schilf-Erlen-Quellwald und einem Sumpfschilf-Erlenbruchwald gebildet, wobei die Erle auf der gesamten Biotopfläche dominiert und die Esche nur punktuell eingestreut ist. Im westlichen Teil des Biotopes nimmt der Anteil an Eschen zu und setzt sich westlich der Straße Zibühl-Peetsch als Erlen-Eschen-Wald fort. (TK 0405-422) Östlich wird der Biotop durch einen Waldweg zerschnitten. Im südlichen Teil des Biotopes befindet sich eine offene Wasserfläche und am südlichen Rand sind 2 Torfstiche vorhanden. In höher gelegenen Bereichen ist die Hasel eingestreut. Eberesche ist auf der gesamten Fläche mit hohem Anteil an Jungaufwuchs vorhanden.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum			☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☒ Flächengröße / Länge ☒ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																	
Gefährdung																																																				
Y W E																																																				
keine Gefährdung ☐																																																				
Empfehlung																																																				
Z S E																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 6 - 3 1 1 - 4 0 1 6

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Alnus glutinosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Phragmites australis

Pflanzenarten ±zahlreich
Carex acutiformis
Solanum dulcamara

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex elata
Urtica dioica

Deschampsia cespitosa

Lysimachia nemorum

Pflanzenarten vereinzelt
Ajuga reptans
Carex paniculata
Circaea lutetiana
Glyceria fluitans
Juncus effusus
Peucedanum palustre
Silene dioica

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alnus incana
Carex pseudocyperus
Cirsium oleraceum
Glyceria maxima
Lemna minor
Phyteuma spicatum
Sorbus aucuparia

Berula erecta
Carex rostrata
Crepis paludosa
Impatiens parviflora
Lycopus europaeus
Ribes rubrum

Betula pubescens
Carex sylvatica
Galium aparine
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Salix cinerea

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 16.06.1999

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: StAUNHRO-Hentschel

Foto: 1

Folgeseiten: 0