**Biotopname**
Weidengebüsch im Feldgehölz östlich der A 19 südlich Kussow

**Standort /Geologie**
Senke in Grundmoräne

X
X

**TK10** 0406 - 411 - **Biotop-Nr.** 4005

**Anschluß in TK**

**Naturraum** Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz
300

| | **Film-Nr.** | **Bild-Nr.** |
|---|---|---|
| Luftbild-Nr. | 77 - | 0195 |
| Größe in ha | 0 , | 3312 |
| Länge in m | , | |
| min. Breite in m | , | |
| max. Breite in m | , | |

**Landkreis / Kreisfreie Stadt**
Güstrow

**Gemeinde / Stadt**
Glasewitz

**lfd. Nr. im Biotopverzeichnis**
13197

**Schutzmerkmale**
geschützt nach §20 LNatG M-V [X]

1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLP | | FND | | NP | | FiB | |
| NSG | | LSG | | BR | | FFH-Geb. | |
| ND | | GLB | | FnB | | Wald-Totalreservat | |

| | **Hauptcod.** | **Nebencode** | | | | | | | | **Überlagerungscode** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VWN | VWD | | | | | | | | UMS |
| % | 90 | 10 | | | | | | | | |

**Vegetationseinheiten**
Waldsimsen-Grauweidengebüsch, Brennessel-Grauweidengebüsch

**Habitate + Strukturen**

**Beschreibung / Besonderheiten**
In einer langgestreckten Moränensenke, umgeben von einem Gehölz, hat sich ein Grauweidengebüsch ausgebildet. Auf nassen bis sehr feuchten, eutroph-reichen Torfen dominiert in der Krautschicht Waldsimse, weiterhin kommen Flutschwaden, Wolfstrapp und Nachtschatten vor. In den weniger nassen Bereichen tritt Frauenfarn auf, der von Sumpfreitgras und Sumpfsegge begleitet wird. In den Randbereichen und verstärkt an der Westseite der Fläche sind Brennessel-Grauweidengebüsche entwickelt, in denen außerdem das Gemeine Rispengras dominiert. Hier sind die Standorte eher feucht und das Substrat degradierter Torf und Antorf. Die Gebüsche werden teilweise von Sandbirken überschirmt. Durch die Lage innerhalb eines Feldgehölzes ist die Fläche relativ geschützt.

**Wertbestimmende Kriterien**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Artenreichtum (Flora) | | vielfältige Standortverhältnisse |
| | Vorkommen seltener / typischer Tierarten | | historische Nutzungsformen |
| | seltener / gefährdeter Pflanzenbestand | | aktuelle Nutzung |
| | seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | | Flächengröße / Länge |
| | natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | | Umgebung relativ störungsarm |
| | gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | | landschaftsprägender Charakter |
| | typische Zonierung von Biotoptypen | | Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion |
| | Struktur- und Habitatreichtum | | |

**Gefährdung**

keine Gefährdung [X]

**Empfehlung**

(c) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Str. 12, 12873 Güstrow, Tel. (03834) 777 - 0

## STANDORTMERKMALE ( k - kleinflächig, g - großflächig )

**TK10** 0406 - 411 - **Biotop-Nr.** 4005

**Substrat**

| k | g | |
|---|---|---|
| | g | Torf, wenig gestört |
| k | | Torf, degradiert |
| k | | Antorf |
| | | Sand |
| | | Kies / Steine |
| | | Lehm |
| | | Ton |
| | | Halbkalk / Kalk |
| | | Schlamm / Faulschlamm |
| | | gestörter Boden |

**Trophie**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | dystroph |
| | | oligotroph |
| | | mesotroph |
| | g | eutroph |
| | | poly- / hypertroph |

**Wasserstufe**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | trocken |
| | | mäßig trocken |
| | | wechselfeucht |
| | | frisch |
| | g | feucht |
| | g | sehr feucht |
| k | | naß |
| | | offenes Wasser |
| | | quellig |

**Relief**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | eben |
| | | wellig |
| | | kuppig |
| | | dünig |
| | | Berg / Rücken |
| | | Riedel |
| | | Flachhang <= 9° |
| | | Steilhang > 9° |
| | | Nische |
| | g | Senke / Strecksenke |
| | | Kerbtal |
| | | Sohlental |

**Exposition**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | N |
| | | NO |
| | | O |
| | | SO |
| | | S |
| | | SW |
| | | W |
| | | NW |

## NUTZUNGSMERKMALE ( k - kleinflächig, g - großflächig )

**Nutzungsintensität**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | intensiv |
| | | extensiv |
| | | aufgelassen |
| | g | keine Nutzung |

**Nutzungsart**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker |
| | | Wiese |
| | | Weide |
| | | forstliche Nutzung |
| | | Fischerei |
| | | Angeln |
| | | Erholung |
| | | Kleingartenbau |
| | | Erwerbsgartenbau |
| | | Ferienhäuser |
| | | Bodenentnahme |
| | | Verkehr |
| | | Ver- / Entsorgungsanlage |
| | | sonstige Nutzung: |

**Umgebung**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker / Gartenbau |
| | | Ackerbrache |
| | | Grünland. intensiv |
| | | Grünland, extensiv |
| | | Laub- / Mischwald |
| | | Nadelwald |
| | | Feuchtwald / -gebüsch |
| | g | Gehölz |
| | | Röhricht / Feuchtbrache |
| | | Hochstauden / Ruderalflur |
| | | Graben |
| | | Fließgewässer |
| | | Stillgewässer |
| | | Trockenbiotop |
| | | Grünanlage / Kleingarten |
| | | Weg |
| | | Straße, Parkplatz |
| | | Bahnanlage |
| | | Gewerbe / Industrie |
| | | Silo / Stallanlage |
| | | Gebäude / Siedlung |
| | | Spülfeld / Halde |
| | | Bodenentnahme |

Pflanzenarten dominant ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Salix cinerea

Pflanzenarten ±zahlreich ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Glyceria fluitans, Poa trivialis, Scirpus sylvaticus

Pflanzenarten vereinzelt ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Betula pendula, Carex acutiformis, Lythrum salicaria, Urtica dioica, Athyrium filix-femina, Equisetum palustre, Polygonum amphibium, Calamagrostis canescens, Juncus effusus, Solanum dulcamara, Calamagrostis epigejos, Lycopus europaeus, Typha latifolia

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 22.08.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Schäfer

Foto: 1 Folgeseiten: 0

(c) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Str. 12, 12873 Güstrow, Tel. (03834) 777 - 0