Biotopname Eutrophes Kesselmoor 800m SSW von Tolzin		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										X																												TK10 0 4 0 6 - 4 2 1 - 4 0 5 9		Biotop-Nr.																											
		X																																																																			
Standort /Geologie Niedermoor				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																	
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0				Luftbild-Nr. <table border="1"><tr><td></td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			7	7										Film-Nr.		Bild-Nr.																																																	
	7	7																																																																			
Landkreis / Kreisfreie Stadt Güstrow		Gemeinde / Stadt Lalendorf		Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					0									<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																										<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																									
			0																																																																		
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 14248				min. Breite in m		max. Breite in m																																																															
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																																			
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																																													
Code V G B		V G S		V W N		S T N		U M L																																																													
% 5 0		3 0		1 0		1 0																																																															
Vegetationseinheiten Steifseggen-Ried, Steifseggen-Sumpfreitgras-Ried, Steifseggen-Grauweiden-Gebüsch																																																																					
Habitats + Strukturen																																																																					
Beschreibung / Besonderheiten Das Gebiet liegt etwa 800m SSW von der Ortsmitte Tolzins entfernt, am Fuße eines Osers (0406-421-4007) in einer Senke. Es scheint sich, abgeleitet von der Oberflächenstruktur und der Lage in der Landschaft, um den hydrologischen Moortyp eines Kesselmoores zu handeln. Aufgrund der Waldfreiheit und der intensiven Bewirtschaftung des Grünlandes in der Umgebung, ist es eutrophiert. Auf etwa der Hälfte der Fläche hat sich ein nasses Steifseggen-Ried gebildet, welches ein zentral gelegenes, sehr feuchtes Steifseggen-Sumpfreitgras-Ried sowie ein Steifseggen-Grauweiden-Gebüsch umschließt. Am äußeren Rand weist das Gebiet eine typische, überstaute Lagg-Zone auf. Über einen Graben ist das Gebiet an ein südlich gelegenes, verbuschtes Kleingewässer angeschlossen. Eine Entwässerung scheint er nicht zu bewirken, ist aber evt. für die Eutrophierung des Moores verantwortlich.																																																																					
Wertbestimmende Kriterien																																																																					
☐ Artenreichtum (Flora)				☐ vielfältige Standortverhältnisse																																																																	
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten				☐ historische Nutzungsformen																																																																	
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				☐ aktuelle Nutzung																																																																	
☒ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				☐ Flächengröße / Länge																																																																	
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				☐ Umgebung relativ störungsarm																																																																	
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				☐ landschaftsprägender Charakter																																																																	
☐ typische Zonierung von Biotoptypen				☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																																	
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																																																					
Gefährdung																																																																					
										keine Gefährdung ☒																																																											
Empfehlung																																																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 6 - 4 2 1 - 4 0 5 9

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	g	Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐		eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐	g	Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Calamagrostis canescens Carex elata

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Salix cinerea

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Alnus glutinosa Betula pubescens Bidens cernua Bidens tripartita
 Glyceria fluitans Lythrum salicaria Lemna minor Juncus effusus
Iris pseudacorus **Hottonia palustris** Ranunculus sceleratus Sparganium erectum
 Alisma plantago-aquatica

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 12.01.2001

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Helke

Foto: 1

Folgeseiten: 0