Biotopname Quellwald südlich des "Fuchsberges"		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							X					X															TK10 0 4 0 7 - 3 2 4 - 4 0 2 8		Biotop-Nr.	
X																																
X																																
Standort / Geologie Quellmoor in der kuppigen Endmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Anschluß in TK																
Naturraum Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz 3 1 0		Gemeinde / Stadt Remplin		Film-Nr. Luftbild-Nr. 7 7 - 0 1 0 0		Bild-Nr.																										
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin				Größe in ha 1		0 5 3 8																										
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 02983		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ 1 NSG ☐ LSG ☐ 1 BR ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ FiB ☐ FFH-Geb. ☐ 1 Wald-Totalreservat ☐																														
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																										
Code W N Q		W F R F G X				U M Q																										
% 9 5		3 2																														
Vegetationseinheiten Brunnenkressen-Erlen-Eschenquellwald; Rasenschmielen-Erlenbruchwald																																
Habitats + Strukturen H D K H S E H Z I H M S H T B H A O																																
Beschreibung / Besonderheiten Der Quellwald befindet sich im stark reliefierten, intensiv genutzten Ackerland südlich des Fuchsberges. Der westliche Bereich des mittelalten Erlenreinbestandes wird von einem Graben zerschnitten, der klares, schnell fließendes Wasser führt und den Wald von Nord nach Süd schwach entwässert. Dominierende Vegetationsform des sehr nassen, schwer begehbaren, eutrophen Standortes ist der Brunnenkressen-Erlenquellwald. Auf wenige, nicht so stark quellige Abschnitte ist der Rasenschmielen-Erlenbruchwald beschränkt. Der auf wenig gestörtem Torf stockende Wald ist von intensiv genutztem Ackerland bzw. Hochstauden begrenzt. Lediglich im Norden schließt ein zunächst degradiertes, entwässertes Feuchtwald an, der weiter nördlich ebenfalls den Charakter eines Quellwaldes aufweist (Standort 43).																																
Wertbestimmende Kriterien																																
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum					☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☒ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																											
Gefährdung																																
Y W E					keine Gefährdung ☐																											
Empfehlung																																
Z S X																																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 7 - 3 2 4 - 4 0 2 8

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	k	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐	g	quellig

Relief
k g

☐	☐		eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐	g	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐	g	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐		keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐	g	forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	g	Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐	k	Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	k	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Alnus glutinosa Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Aegopodium podagraria Deschampsia cespitosa Fraxinus excelsior Geranium palustre
 Glecoma hederacea Nasturtium officinale Ranunculus ficaria Ranunculus repens

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Calamagrostis canescens Carex remota Dryopteris carthusiana Geum urbanum
Iris pseudacorus Sambucus nigra Scutellaria galericulata Urtica dioica

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 03.03.2001

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Umweltplan-Freitag

Foto: 1

Folgeseiten: 0