Biotopname Erlen-Bruchwald im östlichen Bereich vom "Katerkamp"		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																													TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr> </table>		0	4	0	7	4	4	1	4	0	5	5	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					
	X																																																									
0	4	0	7																																																							
4	4	1																																																								
4	0	5	5																																																							
Standort / Geologie Moorsenke im Wald inmitten der welligen Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>7</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table>			7	6	1	1	2	4	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>9</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table>						4	9	1	4																						
	7	6																																																								
1	1	2	4																																																							
4	9	1	4																																																							
Naturraum Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz 3 1 0		Gemeinde / Stadt Grammentin		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>					0	Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																				
			0																																																							
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin		lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 05484		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		NLP <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FND <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			NP <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FiB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>																																											
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NSG <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			LSG <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			BR <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FFH-Geb. <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			Wald-Totalreservat <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			ND <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			GLB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>			FnB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>																																			
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																						
Code W N R																																																										
%		1 0 0																																																								
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Erlen-Bruchwald																																																										
Habitats + Strukturen		H S E		H Z R		H T A		H T B		H A A																																																
Beschreibung / Besonderheiten Im südwestlichen Randbereich des Golchener Forstes und etwa 1,15 km nördlich von Wüstgrabow liegt eine nasse Moorsenke, in der noch temporär Wasserstände über Flur auftreten. Zum Kartierungszeitpunkt waren noch kleinere Restwasserflächen vorhanden. Die Schwarz-Erlen mit erhöhten Stammfüßen stehen unterschiedlich dicht, so daß der Kronenschluß zwischen 30 und 60 % schwanken kann. Nur ein geringer Anteil ist bereits mehrstämmig. Eine Strauchschicht ist kaum ausgebildet (Deckung bis 0,5 %). Die Deckung der Krautschicht schwankt in Abhängigkeit vom Überstauungsregime ebenfalls recht stark und erreicht Deckungswerte von 3 bis 65 %. Umgeben wird der Bruchwaldkomplex von Nadelholz-Forsten.																																																										
Wertbestimmende Kriterien																																																										
☐ Artenreichtum (Flora)														vielfältige Standortverhältnisse																																												
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten														historische Nutzungsformen																																												
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand														aktuelle Nutzung																																												
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft														Flächengröße / Länge																																												
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops														X Umgebung relativ störungsarm																																												
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops														landschaftsprägender Charakter																																												
☒ typische Zonierung von Biotoptypen														Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																												
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																																										
Gefährdung														keine Gefährdung ☒																																												
Empfehlung																																																										

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 7 - 4 4 1 - 4 0 5 5

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
 Alnus glutinosa Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
 Calamagrostis canescens Carex remota Dryopteris carthusiana Galium palustre
 Glyceria fluitans **Iris pseudacorus** Juncus effusus Lemna minor
 Lycopus europaeus Lythrum salicaria Ranunculus repens Solanum dulcamara
 Thelypteris palustris

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 04.09.2002

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Planiver-Voigtländer

Foto: 1

Folgeseiten: 0