

[illegible]

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10		Biotop-Nr.			
				0 4 0 8 - 1 2 1 - 4 0 1 0					
Substrat		Trophie		Wasserstufe		Relief		Exposition	
k g		k g		k g		k g		k g	
Torf, wenig gestört		dystroph		trocken		g eben		N	
g Torf, degradiert		oligotroph		mäßig trocken		wellig		NO	
Antorf		mesotroph		g wechselfeucht		kuppig		O	
Sand		g eutroph		frisch		düinig		SO	
Kies / Steine		poly- / hypertroph		k feucht		Berg / Rücken		S	
Lehm				k sehr feucht		Riedel		SW	
Ton				k naß		Flachhang <= 9°		W	
Halbkalk / Kalk				offenes Wasser		Steilhang > 9°		NW	
Schlamm / Faulschlamm						Nische			
				quellig		Senke / Strecksenke			
gestörter Boden						Kerbtal			
						Sohllental			
NUTZUNGSMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)							
Nutzungsintensität				Umgebung		k g			
k g		k g		k g		k g			
intensiv		Fischerei		Acker / Gartenbau		Fließgewässer			
k extensiv		k Angeln		Ackerbrache		Stillgewässer			
aufgelassen		k Erholung		Grünland. intensiv		Trockenbiotop			
g keine Nutzung		Kleingartenbau		Grünland, extensiv		k Grünanlage / Kleingarten			
		Erwerbsgartenbau		Laub- / Mischwald		k Weg			
		Ferienhäuser		Nadelwald		Straße, Parkplatz			
Nutzungsart		Bodenentnahme		Feuchtwald / -gebüsch		Bahnanlage			
k g		Verkehr		Gehölz		Gewerbe / Industrie			
Acker		Ver- / Entsorgungsanlage		g Röhricht / Feuchtbrache		Silo / Stallanlage			
Wiese		sonstige Nutzung:		Hochstauden / Ruderalflur		Gebäude / Siedlung			
Weide				g Graben		Spülfeld / Halde			
forstliche Nutzung						Bodenentnahme			
Pflanzenarten dominant		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)							
Pflanzenarten ±zahlreich		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)							
Alnus glutinosa		Calystegia sepium		Carex acutiformis		Carex riparia			
Deschampsia cespitosa		Glecoma hederacea		Glyceria maxima		Phalaris arundinacea			
Phragmites australis		Ranunculus ficaria		Salix cinerea		Urtica dioica			
Pflanzenarten vereinzelt		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)							
Aegopodium podagraria		Agrostis stolonifera		<u>Angelica sylvestris</u>		Anthriscus sylvestris			
Arctium lappa		Brachythecium rutabulum		<u>Carex cespitosa</u>		Carex elata			
Cirsium arvense		Epilobium hirsutum		Euonymus europaeus		Filipendula ulmaria			
Fraxinus excelsior		Galium aparine		Geum rivale		Holcus lanatus			
Humulus lupulus		Iris pseudacorus		Lathyrus pratensis		Lemna minor			
Lycopus europaeus		Lysimachia vulgaris		Lythrum salicaria		Ranunculus repens			
Ranunculus sceleratus		Ribes nigrum		Salix fragilis		Salix viminalis			
Sambucus nigra		Solanum dulcamara		Stellaria media		Symphytum officinale			
Typha latifolia									
Angaben zur Fauna									
Biber-Fraßspuren, Eisvogel									
Verwendete Unterlagen						Datum erste Begehung: 26.03.2003			
						Datum letzte Begehung:			
Bearbeiter/in: IBS-Weinauge						Foto: 3		Folgeseiten: 0	