Biotopname Grauweidengebüsch südwestlich von Upatel		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															X																							TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> </table>		0	4	0	8	2	2	4	4	0	0	9	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					
	X																																																									
0	4	0	8																																																							
2	2	4																																																								
4	0	0	9																																																							
Standort /Geologie Vermoorte Senke mit Anschluß an ein Bachtal in d.Grunmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																						
Naturraum Lehmplatten nördlich der Peene 2 0 0				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>5</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table>			5	7	0	5	1	4	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																													
	5	7																																																								
0	5	1	4																																																							
Landkreis / Kreisfreie Stadt Ostvorpommern		Gemeinde / Stadt Gützkow, Stadt Kölzin		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr> </table>					8	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td></tr> </table>		0	7	9	1																																											
			8																																																							
0	7	9	1																																																							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 05387				Größe in m Länge in m min. Breite in m max. Breite in m		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																				
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																								
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																																				
Code V W D		V W N		V R L		V H D																																																				
% 4 0		3 0		2 5		5																																																				
Vegetationseinheiten Brennessel-Grauweidengebüsch; Lorbeerweiden-Grauweidengebüsch;Brennessel-Schilfröhricht; Ackerkratzdistel-Brennessel-Hochstaudenflur																																																										
Habitats + Strukturen																																																										
Beschreibung / Besonderheiten Es handelt sich um ein heterogenes Feuchtgebüsch mit angrenzendem aufgelassenem Grünland auf einem entwässerten Niedermoorstandort mit degradiertem Torf, der sehr kleinflächig sehr feucht ist (vermutlich ehemalige Handtorfstiche). Das Biotop ist an drei Seiten von Ackerland umgeben, nordöstlich setzt sich das aufgelassene Grünland in Form von Hochstaudenfluren (VHD) fort. Mit den schwer zugänglichen von Grauweiden dominierten Gebüschbereiche sind randlich Schilfröhrichte bzw. Brennessel-Hochstaudenflure eng verzahnt, z.T. bilden sie auch gehölzfreie Inseln innerhalb der Gebüschkomplexe. Für eine Aufwertung und Erhaltung des Biotops ist eine Einstellung der Entwässerung dringend zu empfehlen. Da das gesamte Biotop wesentlich tiefer als die umgebenden Ackerflächen liegt, sind negative Folgen auf die Äcker nicht zu erwarten. Eine Einstellung der Entwässerung hätte auch positive Auswirkungen für die "grabenabwärts" sich anschließenden Feuchtwiesen und die das nährstoffreiche Wasser aufnehmende Swinow. Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist äußerst günstig, da nur ein Graben das Wasser des gesamten Komplexes abführt.																																																										
Wertbestimmende Kriterien																																																										
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum				☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																						
Gefährdung																																																										
Y L S		Y W E				keine Gefährdung ☐																																																				
Empfehlung																																																										
Z S X																																																										

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 8 - 2 2 4 - 4 0 0 9

Substrat

k	g	
		Torf, wenig gestört
	g	Torf, degradiert
k		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
		mesotroph
	g	eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
	g	frisch
	g	feucht
k		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
		Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohlental

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
k		aufgelassen
	g	keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
	g	Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
k		Hochstauden / Ruderalflur
k		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Salix cinerea Phragmites australis Urtica dioica

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Salix pentandra

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Humulus lupulus	Populus tremula	Rubus idaeus	Salix alba
Sambucus nigra	Sorbus aucuparia	Anthriscus sylvestris	Calamagrostis epigejos
Carex elata	<u>Carex nigra</u>	Carex pseudocyperus	Carex riparia
Cirsium arvense	Cirsium oleraceum	Deschampsia cespitosa	Geum urbanum
Iris pseudacorus	Juncus effusus	Lycopus europaeus	Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria	Peucedanum palustre	Phalaris arundinacea	Scrophularia nodosa
Solanum dulcamara	Symphytum officinale	<u>Thalictrum flavum</u>	Thelypteris palustris

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 22.07.2003	
	Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: Grünspektrum-Grabow	Foto: 1	Folgeseiten: 0