Biotopname Rispenseggenried nordwestlich Gützkow		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 4 0 8 - 3 3 2 - 4 0 0 9		Biotop-Nr.	
			X																																		
Standort / Geologie Soll				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																	
Naturraum Kuppiges Tollensegebiet mit Werder 3 2 0				Film-Nr. Luftbild-Nr. 7 8 - 0 4 1 9		Bild-Nr.																															
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin		Gemeinde / Stadt Röckwitz		Größe in ha		Länge in m		min. Breite in m																													
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 13261				max. Breite in m																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐		NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐		ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																													
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																													
Code V G B		R H U		V G R		S V S		F Q S F G N																													
%		8 8		1 0		1																															
Vegetationseinheiten Rispenseggen-Quellried, Sumpfschilf-Quellröhricht; Brennesselfur; Sumpfschilf; Wasserlinsen-Schwimmbblattvegetation																																					
Habitate + Strukturen																																					
Beschreibung / Besonderheiten Dieses Ackersoll ist vollständig mit einem Rispenseggen-Quellried (68%) bewachsen. Da die gesamte Fläche am Sollgrund gen Nordwesten geneigt ist, kann es sich nicht um ein verlandetes Gewässer, sondern nur um einen Quellsumpf handeln. Das gesamte Soll wird von Nordwesten nach Südosten von einem fast zugewachsenen Graben durchzogen. Im Südostteil des Grabens befindet sich ein ca. 20m ² großes Sumpfschilf. Die Sumpfschilf ist übrigens regelmäßig zwischen den prägenden Horsten der Rispensegge anzutreffen. Im mittleren und südlichen Ostteil befindet sich kleinflächig ein Schilf-Quellröhricht (20%), welches z.T. den nördlichen Bereich des Rispenseggen-Quellried durchdringt. Die Ackerkante des Solles wird von einer Brennesselfur eingenommen.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
Artenreichtum (Flora)					vielfältige Standortverhältnisse																																
Vorkommen seltener / typischer Tierarten					historische Nutzungsformen																																
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand					aktuelle Nutzung																																
X seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft					Flächengröße / Länge																																
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops					X Umgebung relativ störungsarm																																
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops					X landschaftsprägender Charakter																																
typische Zonierung von Biotoptypen					X Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																
Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung																																					
Y S I Y S E Y W E								keine Gefährdung ☐																													
Empfehlung																																					
Z M E Z S R																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 8 - 3 3 2 - 4 0 0 9

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	g Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	g eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	k frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	k offenes Wasser
☐	☐	g quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	g Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	g aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	g Acker / Gartenbau
☐	☐	k Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	k Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex paniculata

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex acutiformis Phragmites australis

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Anthriscus sylvestris Calamagrostis canescens Carex riparia Cirsium arvense
Crataegus monogyna Equisetum fluviatile Galium aparine Juncus effusus
Lathyrus pratensis Lemna minor Lythrum salicaria Phalaris arundinacea
Sambucus nigra Scirpus sylvaticus Urtica dioica

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 02.05.2003

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Planiver-Schwarz

Foto: 1

Folgeseiten: 0