Biotopname Rotstrausgrassas- Rasen südöstlich Wietzow		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 4 0 8 - 4 1 1 - 4 0 0 7		Biotop-Nr.	
			X																																		
Standort /Geologie Grundmoränensande		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Anschluß in TK															
Naturraum Lehmplatten südlich der Peene 2 0 1		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Film-Nr. Luftbild-Nr. 7 8 - 0 0 8 7		Bild-Nr.													
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin		Gemeinde / Stadt Daberkow		Größe in ha 1		1 8 1 9																															
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 14519		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				min. Länge in m															
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG 1 BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐		max. Länge in m																																	
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																															
Code T M S T M D		A B O																																			
%		8 0 2 0																																			
Vegetationseinheiten Widertonmoos- Rotstrausgrassas- Rasen, Honiggras- Rotstrausgrassas- Rasen																																					
Habitats + Strukturen		D H F																																			
Beschreibung / Besonderheiten Auf überwiegend leicht nach West geneigten mesotrophen und mäßig trockenen kiesigen Grundmoränensanden hat sich nach Auffassung der Ackernutzung ein Widertonmoos- Rotstrausgrassas- Rasen entwickelt. Die Moosschicht ist sehr dicht ausgebildet, in stärker ruderalisierten Bereichen tritt Honiggras zahlreich auf. Im Osten führt ein unbefestigter Fahrweg teilweise durch den Biotop (OVU < 1%). Stärker ruderalisierte Ackerbrache umgibt den Biotop.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
☐ Artenreichtum (Flora)				vielfältige Standortverhältnisse																																	
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten				historische Nutzungsformen																																	
☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				aktuelle Nutzung																																	
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				Flächengröße / Länge																																	
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				Umgebung relativ störungsarm																																	
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				landschaftsprägender Charakter																																	
☐ typische Zonierung von Biotoptypen				Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																	
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung																																					
Y L S				keine Gefährdung ☐																																	
Empfehlung																																					
Z M B																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 8 - 4 1 1 - 4 0 0 7

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☒	Sand
☐	☒	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☒	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☒	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☒	Flachhang <= 9°
☒	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☒	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☒	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☒	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Agrostis capillaris Polytrichum piliferum

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Brachythecium rutabulum Cladonia spec. Filago minima Hieracium pilosella
 Holcus lanatus Hypnum cupressiforme Hypochoeris radicata

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Calamagrostis epigejos Dactylis glomerata Festuca ovina agg. **Helichrysum arenarium**
 Scleropodium purum

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 11.04.2003

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Dubbert

Foto: 1

Folgeseiten: 0