

Biotopname														TK10				Biotop-Nr.			
Karnickelbarg						X								0 4 0 9 - 1 2 3 - 4 0 0 4							
Standort /Geologie														Anschluß in TK							
Extensivgrünland, sandige Erhöhung der Grundmoräne																					
Naturraum Lehmplatten nördlich der Peene														Film-Nr.				Bild-Nr.			
2 0 0														Luftbild-Nr. 5 7				0 4 9 3			
Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt								Größe in ha				3 4 7 3			
Ostvorpommern						Klein Bünzow								Länge in m							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis														min. Breite in m							
08050														max. Breite in m							
Schutzmerkmale						1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil								FiB							
geschützt nach §20 LNatG M-V						NLP FND NP								FFH-Geb.							
X						NSG LSG BR															
						ND GLB FnB Wald-Totalreservat															
Hauptcod.		Nebencode										Überlagerungscode									
Code T M D																					
% 1 0 0																					
Vegetationseinheiten																					
Kleiner Sauerampfer-Rotstraußgrasflur																					
Habitate + Strukturen																					
Beschreibung / Besonderheiten																					
Am Rande eines Waldes befindet sich in der Nähe von Klein Bünzow auf einer sandigen Kuppe der Grundmoräne, dem sogenannten Karnickelbarg, ein Extensivgrünland auf einem mesotrophen Trockenstandort, vermutlich eine ältere Ackerbrache. Hier hat sich auf relativ großer Fläche eine einförmige, artenarme Kleiner Sauerampfer-Rotstraußgrasflur als ein ruderalisierter Sandmagerrasen herausgebildet. Die Fläche wird gemäht. Die Vegetation wird von Rotstraußgras dominiert.																					
Wertbestimmende Kriterien																					
Artenreichtum (Flora)vielfältige Standortverhältnisse																					
Vorkommen seltener / typischer Tierartenhistorische Nutzungsformen																					
seltener / gefährdeter Pflanzenbestandaktuelle Nutzung																					
seltene / gefährdete PflanzengesellschaftFlächengröße / Länge																					
natürliche / naturnahe Ausprägung des BiotopsUmgebung relativ störungsarm																					
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotopslandschaftsprägender Charakter																					
typische Zonierung von BiotoptypenTrittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																					
Struktur- und Habitatreichtum																					
Gefährdung																					
keine Gefährdung X																					
Empfehlung																					
Mahd wie bisher oder Beweidung																					
Z M M Z M B																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.															
				0		4		0		9		-		1		2		3		-		4		0		0		4	
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition													
k g				k g				k g				k g				k g													
☐ ☐ Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ ☐ g eben				☐ ☐ N													
☐ ☐ Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ g mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO													
☐ ☐ Antorf				☐ ☐ g mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O													
☐ ☐ g Sand				☐ ☐ eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO													
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ g Berg / Rücken				☐ ☐ S													
☐ ☐ Lehm								☐ ☐ sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW													
☐ ☐ Ton								☐ ☐ naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W													
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW													
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																	
								☐ ☐ quellig				☐ ☐ Senke / Strecksenke																	
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																	
												☐ ☐ Sohlental																	
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																													
Nutzungsintensität												Umgebung																	
k g												k g												k g					
☐ ☐ intensiv												☐ ☐ Fischerei												☐ ☐ Fließgewässer					
☐ ☐ g extensiv												☐ ☐ Angeln												☐ ☐ Stillgewässer					
☐ ☐ aufgelassen												☐ ☐ Erholung												☐ ☐ Trockenbiotop					
☐ ☐ keine Nutzung												☐ ☐ Kleingartenbau												☐ ☐ Grünland, intensiv					
												☐ ☐ Erwerbsgartenbau												☐ ☐ Grünland, extensiv					
												☐ ☐ Ferienhäuser												☐ ☐ Laub- / Mischwald					
												☐ ☐ Bodenentnahme												☐ ☐ Nadelwald					
												☐ ☐ Verkehr												☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch					
												☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage												☐ ☐ Gehölz					
												☐ ☐ sonstige Nutzung:												☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache					
																								☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur					
																								☐ ☐ Graben					
																								☐ ☐ Straße, Parkplatz					
																								☐ ☐ Bahnanlage					
																								☐ ☐ Gewerbe / Industrie					
																								☐ ☐ Silo / Stallanlage					
																								☐ ☐ Gebäude / Siedlung					
																								☐ ☐ Spülfeld / Halde					
																								☐ ☐ Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Agrostis capillaris																													
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Achillea millefolium Holcus lanatus Rumex acetosella																													
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Festuca ovina agg. Hypochaeris radicata																													
Angaben zur Fauna																													
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 18.09.2003													
																Datum letzte Begehung:													
Bearbeiter/in: Grünspektrum-Fischer																Foto: 1								Folgeseiten: 0					