Biotopname Birken-Gehölz im Usedomer Stadtforst, etwa 900 m östlich vom "Lamboschsee"		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 4 0 9 - 2 4 2 - 4 0 1 4		Biotop-Nr.																															
			X																																																																
Standort / Geologie Moorsenke in einem Beckensandgebiet im Sanderbereich		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				7	4															Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		0	1	0	9					6	3	5	9												
		7	4																																																																
0	1	0	9																																																																
6	3	5	9																																																																
Naturraum Insel Usedom 1 3 0		Gemeinde / Stadt Stolpe auf Usedom		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					2															min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																							
			2																																																																
Landkreis / Kreisfreie Stadt Ostvorpommern		lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 10734		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		Film-Nr.		Bild-Nr.																																																											
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP	☐	FND	☐	NP	1	FiB	☐																																																										
		NSG	☐	LSG	1	BR	☐	FFH-Geb.	☐																																																										
		ND	☐	GLB	☐	FNB	☐	Wald-Totalreservat	☐																																																										
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																																											
Code W F R		W Y G		V H D																																																															
% 5 0		4 5		5																																																															
Vegetationseinheiten Himbeer-Birken-Bruchwald, Rasenschmielen-Birken-Bruchwald, Himbeer-Schwarzerlen-Bruchwald, Grauerlen-Forst, Brennessel-Dost-Hochstaudenflur																																																																			
Habitats + Strukturen <table border="1"> <tr><td>H</td><td>S</td><td>E</td><td>H</td><td>Z</td><td>R</td><td>H</td><td>T</td><td>B</td><td>H</td><td>A</td><td>O</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										H	S	E	H	Z	R	H	T	B	H	A	O																																														
H	S	E	H	Z	R	H	T	B	H	A	O																																																								
Beschreibung / Besonderheiten Ca. 2 km nordnordwestlich von Stolpe befindet sich eine von Beckensanden umschlossene vermoorte Niederung. Sie wird seit langem durch ein Grabensystem in Richtung Kleines Haff entwässert. Die gesamte Niederung wurde über lange Zeit als Grünland genutzt. Die Torfe leiden unter Vermullungserscheinungen. Aus den ursprünglich mesotrophen Standortverhältnissen wurden durch die Torfzersetzung und Nährstoffeinträge deutlich eutrophe. Gegenwärtig befindet sich im Zentrum der Senke ein aus verschiedenen Teilen zusammengesetzter Bruchwaldkomplex. Im Nordteil stockt ein Rasenschmielen- bzw. Himbeer-Birken-Bruchwald. In der lückigen Baumschicht, die einen Kronenschluß von etwa 40 bis 80 % erreicht, wachsen neben der Birke auch einige Kiefern. Die Strauchschicht erreicht eine Deckung von nur 1 bis 2 %. In der Bodenvegetation verblieben noch wenige Arten des ursprünglichen Pfeifengras-Birken-Bruchwaldes. Beispiele hierfür sind <i>Molinia caerulea</i> , <i>Viola palustris</i> , <i>Peucedanum palustre</i> , <i>Frangula alnus</i> und <i>Salix aurita</i> . Die Mehrheit der Arten sind typische Vertreter entwässerter eutropher Bruchwälder. Wo die Bäume größere Lücken bilden haben sich Hochstaudenfluren mit viel Dost, Brennessel und Sumpf-Reitgras entwickelt. Im Westen schließt sich ein kleinerer Himbeer-Erlen-Bruchwald an. Auch hier dominieren Arten nährstoffreicher Bruchwälder. Im Süden wurde ein Grauerlen-Bestand aufgeforstet. Im Bereich des durch den Bruchwaldkomplexes von Norden nach Süden verlaufenden Grabens haben sich noch <i>Carex paniculata</i> , <i>Hottonia palustris</i> und <i>Hydrocotyle vulgaris</i> erhalten.																																																																			
Wertbestimmende Kriterien																																																																			
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum					☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																														
Gefährdung																																																																			
									keine Gefährdung ☒																																																										
Empfehlung																																																																			

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 9 - 2 4 2 - 4 0 1 4

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Betula pubescens	<u>Calamagrostis canescens</u>	Deschampsia cespitosa	Eupatorium cannabinum
Rubus idaeus	Urtica dioica		

Pflanzenarten ±zahlreich

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Aegopodium podagraria	Athyrium filix-femina	Brachypodium sylvaticum	Cirsium oleraceum
Dryopteris carthusiana	Equisetum palustre	Festuca gigantea	Frangula alnus
Galeopsis tetrahit	Galium palustre	Geranium robertianum	Geum urbanum
Hottonia palustris	<u>Hydrocotyle vulgaris</u>	Lycopus europaeus	Lythrum salicaria
Mentha aquatica	Molinia caerulea	Oxalis acetosella	Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea	Phragmites australis	Pinus sylvestris	Ranunculus repens
Sorbus aucuparia	Viola palustris		

Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Acer pseudoplatanus	Carex paniculata	Cirsium palustre	Crataegus monogyna
Lonicera periclymenum	Padus serotina	Salix aurita	Salix cinerea
Stachys palustris			

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 03.09.2003

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: plan4-Voigtländer

Foto: 1

Folgeseiten: 0