Biotopname Nasswiesen im Randowtal 300 m NO Hesskamp		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																						TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table>		0	4	1	0	3	3	4	4	0	2	4
0	4	1	0																																																	
3	3	4																																																		
4	0	2	4																																																	
Standort /Geologie schwach geneigtes Niedermoor / Flusstalmoor		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																
Naturraum Randowtal 3 3 2		Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>7</td><td>3</td></tr> </table>			7	3	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>6</td></tr> </table>		0	2	7	6																																								
	7	3																																																		
0	2	7	6																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Eggesin, Stadt		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					1																																											
			1																																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01166		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NP <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FiB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NSG <table border="1"><tr><td></td></tr></table> LSG <table border="1"><tr><td></td></tr></table> BR <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FFH-Geb. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> ND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> GLB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FnB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Wald-Totalreservat <table border="1"><tr><td></td></tr></table>																																																		
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																				
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																
Code G F R		G F M V W N		V R P																																																
%		8 2		1 0 5 3																																																
Vegetationseinheiten mädesüßreiche Schlankseggen-Wiesenfuchsschwanz-Nasswiese, Wasserschwaden-Waldsimsen-Nasswiese, Sumpfbloodaugen-Schlankseggen-Nasswiese, Kümmelsilgen-Mädesüß-Feuchtwiese, Schwertlilien-Grauweiden-Feuchtgebüsch, Wasserschwaden-Schilfröhricht																																																				
Habitate + Strukturen		C Z V																																																		
Beschreibung / Besonderheiten Artenreiche Nasswiese SW Eggesin im Randowtal, 300 m NO des Wasserwerkes Hesskamp, westlich des Flusses und südlich eines Weges gelegen. Der Talmoorbereich ist schwach nach O zum Fluss geneigt, es herrschen nasse bis sehr feuchte, eutrophe und kleinflächig mesotrophe Standortbedingungen. Der größte Teil des Biotops wird von einer Schlankseggen-Wiesenfuchsschwanzweise eingenommen, die stellenweise auch beherrscht wird von Schilf, Großem Wasserschwaden, Mädesüß, Zweizeilsegge oder Waldsimse. Kleine Bereiche am W-Rand und im Zentrum haben mesotrophen Charakter, es treten Arten wie Wiesen- und Hirsesegge, Sumpfbloodauge, Strauß-Gilbweiderich, Flammender Hahnenfuß oder Kleiner Baldrian auf. Am Wegesrand im N und in Bereichen mit schwächerer Nutzung im S haben sich kleinflächig Grauweiden-Feuchtgebüsche und Schilfbestände gebildet. Im S geht das Biotop in Feuchtgebüsche (s. Biotop 25) über, ansonsten grenzen Gehölze, Acker, Ruderaler Staudenfluren sowie der Weg und der Fluss an.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☒	Artenreichtum (Flora)			vielfältige Standortverhältnisse																																																
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten			historische Nutzungsformen																																																
☒	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand			aktuelle Nutzung																																																
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft			Flächengröße / Länge																																																
☐	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops			Umgebung relativ störungsarm																																																
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops			landschaftsprägender Charakter																																																
☐	typische Zonierung von Biotoptypen			Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																
☐	Struktur- und Habitatreichtum																																																			
Gefährdung																																																				
					keine Gefährdung ☒																																															
Empfehlung																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 1 0 - 3 3 4 - 4 0 2 4

Substrat

k	g	
	g	Torf, wenig gestört
		Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
k		mesotroph
	g	eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
		feucht
	g	sehr feucht
	g	naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
		eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
	g	Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
		Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohllental

Exposition

k	g	
		N
		NO
	g	O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
	g	extensiv
k		aufgelassen
		keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
	g	Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

Fischerei

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
k		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
k		Feuchtwald / -gebüsch
	g	Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
k		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

Fließgewässer

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
k		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Agrostis stolonifera	<u>Alopecurus pratensis</u>	<u>Carex disticha</u>	Carex gracilis
Filipendula ulmaria	Galium palustre	Glyceria fluitans	Glyceria maxima
Phragmites australis	Scirpus sylvaticus		

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Caltha palustris	<u>Cardamine pratensis</u>	Carex acutiformis	Carex elata
<u>Carex nigra</u>	<u>Carex panicea</u>	Carex riparia	Deschampsia cespitosa
Geum rivale	Iris pseudacorus	Juncus articulatus	Juncus effusus
Lotus uliginosus	<u>Luzula campestris</u>	Lysimachia thyriflora	Lysimachia vulgaris
Myosotis palustris	Phalaris arundinacea	Poa trivialis	Potentilla anserina
<u>Potentilla palustris</u>	<u>Ranunculus flammula</u>	Ranunculus repens	Rumex acetosa
Rumex crispus	Rumex obtusifolius	Salix cinerea	<u>Selinum carvifolia</u>
Symphytum officinale	Taraxacum officinale	<u>Thalictrum flavum</u>	Trifolium pratense
Urtica dioica	<u>Valeriana dioica</u>	Veronica beccabunga	

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 06.05.2004

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Seuffert

Foto: 2

Folgeseiten: 0