Biotopname Pionier- u. Zwergstrauchheidenveget. ca. 1,7 km n Moritzberg		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											X																											TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr> </table>		0	4	1	0	3	4	2	4	0	5	0
			X																																																	
0	4	1	0																																																	
3	4	2																																																		
4	0	5	0																																																	
Standort /Geologie Binnendüne auf glazilimnischen Beckensanden				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
Naturraum Ueckermünder Heide <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>		2	2	1			Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>6</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			6	0	0	3	1	0																																					
2	2	1																																																		
	6	0																																																		
0	3	1	0																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Altwarp		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ,					0																																											
			0																																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01553				Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>6</td><td>8</td><td>3</td></tr> </table>		1	6	8	3																																											
1	6	8	3																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐		FiB ☐ FFH-Geb. ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																														
Code T P S		T Z T		T M S		B F X		O V D		R H K																																										
%		4 4		3 8		8		4		4		2																																								
Vegetationseinheiten moosreiche Silbergrasflur, Drahtschmielen-Heidekrautheide, Silbergras-Sandseggenflur, Birken-Baumgruppe, Kiefern-Baumgruppe, Landreitgrasflur																																																				
Habitate + Strukturen D G O																																																				
Beschreibung / Besonderheiten Im Bereich eines ehemals militärisch genutzten Geländes entwickelte sich auf trockenen, oligotrophen Sanden eine Pionier- und Zwergstrauchheidenvegetation. Im westlichen Teil des Biotops lässt sich v.a. eine moosreiche Silbergrasflur mit Glashaar-Widertonmoos (Polytrichum piliferum), Rentierflechte (Cladonia spec.) und Frühlings-Spergel finden. Im Südwesten dominiert die Drahtschmielen-Heidekrautheide mit Rotstengelmoos (Pleurozium schreberi) und im zentralen Teil ist eine Silbergras-Sandseggenflur anzutreffen. Im Norden greift kleinflächig eine Landreitgrasflur in den Biotop hinein. Innerhalb der Biotopgrenzen befinden sich des Weiteren eine Birken-Baumgruppe und eine Kiefern-Baumgruppe. Die Geländeoberfläche ist durch die ehemalige militärische Nutzung stark reliefiert. Dementsprechend verzahnen sich die Vegetationseinheiten stellenweise kleinflächig. Im Süden und im Norden verläuft ein unbefestigter Sandweg von Nordwest nach Südost durch den Biotop. Der Biotop wird von lichthem Kiefernaufwuchs im Osten, aber auch von Ruderalflur und kleinflächig von unbefestigten Wegen umgeben.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum						☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																														
Gefährdung																																																				
										keine Gefährdung ☒																																										
Empfehlung																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 1 0 - 3 4 2 - 4 0 5 0

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☒	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☒	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☒	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☒	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☒	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☒	S
☐	☐	SW
☐	☒	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☒	keine Nutzung

Nutzungsart

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☒	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☒	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☒	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Calluna vulgaris

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Corynephorus canescens

Polytrichum piliferum

Pflanzenarten ±zahlreich
Avenella flexuosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Carex arenaria

Cladophora spec.

Pleurozium schreberi

Pflanzenarten vereinzelt
Betula pendula
Spergula morisonii

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Calamagrostis epigejos

Festuca ovina agg.

Pinus sylvestris

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen UWM M-V[Hrsg] (2003): Die Naturschutzgebiete in Meckl.-Vorp.

Datum erste Begehung: 05.05.2004

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Sütering

Foto: 1

Folgeseiten: 0