Biotopname Sandmagerrasen ca. 0,3km sw.Altwarp		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																													TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>		0	4	1	0	4	3	1	4	0	2	3	Biotop-Nr.	
	X																																																					
0	4	1	0																																																			
4	3	1																																																				
4	0	2	3																																																			
Standort /Geologie Binnendüne auf glazilimnischen Beckensanden				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
Naturraum Ueckermünder Heide				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>6</td><td>0</td></tr> </table>			6	0	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td></tr> </table>		0	2	8	0																																								
	6	0																																																				
0	2	8	0																																																			
<table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>		2	2	1			Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>					0	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>7</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>		2	7	4	6																																				
2	2	1																																																				
			0																																																			
2	7	4	6																																																			
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Altwarp		Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																						
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01729				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																																																		
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ 1 LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ 1 ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																				
		Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																														
		Code T M S		T M D T P S				U G D																																														
		% 7 0		2 0 1 0																																																		
Vegetationseinheiten Sandseggenflur, moosreiche Sandseggenflur, Rotschwengel-Sandseggenflur, Rotstraußgras-Schwengelrasen, Sandseggen-Silbergrasflur																																																						
Habitate + Strukturen D H F																																																						
Beschreibung / Besonderheiten Auf einer Rabattenkultur-Fläche entwickelte sich großflächig eine Sandseggenflur mit Kleinem Habichtskraut, Sand-Strohblume, Gemeiner Grasnelke, Silbergras und vereinzelt Kiefern-Aufwuchs. Randlich geht diese über in eine moosreiche Sandseggenflur mit Gemeiner Grasnelke, Draht-Schmiele, Kartäuser Nelke und Rotstengelmoos (Pleurozium schreberi). Im nordwestlichen Teil des Biotops ist eine Rotschwengel-Sandseggenflur ausgebildet. Im nordöstlichen Teil erstreckt sich ein Rotstraußgras-Schwengelrasen mit Rot-Schwengel und Rauhblasschwengel, Steppen-Lieschgras und Schmalblättrigem Rispengras. Im Süden des Biotops befindet sich eine Sandseggen-Silbergrasflur mit Frühlings-Spergel und Glashaar-Widertonmoos (Polytrichum piliferum). Umgeben wird der Biotop großflächig von einem Laubwald frischer Standorte. Im Nordosten und Süden grenzt er an einen Weg, ansonsten schließt sich eine ruderale Kriechflur an.																																																						
Wertbestimmende Kriterien																																																						
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☒ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum					vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																	
Gefährdung																																																						
									keine Gefährdung ☒																																													
Empfehlung																																																						

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 1 0 - 4 3 1 - 4 0 2 3

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☒	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☒	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☒	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☒	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☒	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☒	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☒	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☒	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☒	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex arenaria Pleurozium schreberi

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Festuca rubra Festuca trachyphylla Hieracium pilosella Polytrichum piliferum

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Agrostis capillaris Artemisia maritima Avenella flexuosa Carex pilulifera
Cladonia spec. Corynephorus canescens Dianthus carthusianorum **Dicranum scoparium**
Helichrysum arenarium Phleum phleoides Pinus sylvestris Plantago lanceolata
Poa angustifolia Spargula morisonii

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	UWM M-V[Hrsg] (2003): Die Naturschutzgebiete in Meckl.-Vorp.	Datum erste Begehung:	20.12.2003
Bearbeiter/in:	IBS-Sütering	Datum letzte Begehung:	
		Foto:	1
		Folgeseiten:	0