Biotopname Kalkflachmoor östlich Deponie Schelfwerder		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								X	X					X	X																							TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>		0	5	0	4	2	2	2	4	0	2	1
X	X																																																			
X	X																																																			
0	5	0	4																																																	
2	2	2																																																		
4	0	2	1																																																	
Standort /Geologie Verlandungsmoor auf Kalkmudde einer alten Seeterrasse				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
Naturraum Schweriner Seengebiet 4 0 2				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>2</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td></tr> </table>			2	7	0	5	1	7																																								
	2	7																																																		
0	5	1	7																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Kreisfreie Stadt		Gemeinde / Stadt Schwerin, Landeshauptstadt		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td></tr> </table> Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					3	4	0	6	1																																							
			3																																																	
4	0	6	1																																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 00554				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> FND <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> NP <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> FiB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> NSG <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> LSG 1 BR <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> FFH-Geb. <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> ND <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> GLB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> FnB <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table> Wald-Totalreservat <table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>																																																
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																				
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																														
Code M Z W		W N R		M Z P		V G S		V R P		M Z B		V R R		U M V																																						
% 4 0		3 0		1 0		5		5		5		5																																								
Vegetationseinheiten Sumpfreitgras-Grauweidengebüsch, Sumpfschilf-Erlenbruchwald, Pfeifengras-Wunderseggen-Staudenflur, Sumpfreitgras-Wunderseggen-Staudenflur, Kalkbinsenried, Rohrglanzgras-Röhricht, Sumpfreitgrasried, Sumpffarn-Schilfröhricht																																																				
Habitats + Strukturen <table border="1"> <tr> <td>H</td><td>D</td><td>K</td> <td>H</td><td>D</td><td>R</td> <td>H</td><td>S</td><td>E</td> <td>H</td><td>Z</td><td>M</td> <td>H</td><td>M</td><td>H</td> <td>H</td><td>A</td><td>J</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																H	D	K	H	D	R	H	S	E	H	Z	M	H	M	H	H	A	J																			
H	D	K	H	D	R	H	S	E	H	Z	M	H	M	H	H	A	J																																			
Beschreibung / Besonderheiten Verlandungsmoor am Randes des Schweriner Sees, auf basiphilem Standort. Heterogene Durchmischung von Erlenbruchwald, Weidengebüsch und Offenbereichen. Die gehölzfreien Bereiche liegen zumeist seewärts. Auf kalkreichen Seeablagerungen der alten Seeterrasse haben sich hier charakteristische, in ihrer Artenzusammensetzung aber bereits verarmte Pflanzengesellschaften der Kalkflachmoore ausgebreitet. Neben Riedern der Stumpfbliätigen Binse finden sich mosaikartig verzahnt Pfeifengras-Schwarzschofseggenrieder, Sumpfreitgras-Schwarzschofseggenrieder, Sumpfreitgrasrieder und Rohrglanzgrasbestände. Die Schwarzschof-Segge wird durch Sumpfreitgras, Rohrglanzgras und Stumpfbliätige Binse überwuchert und allmählich verdrängt. Stellenweise treten abgestorbene Bulte auf. Moose sind aufgrund der starken vegetativen Entwicklung der Gräser nicht ausgebildet. Zum seewärts anschließenden Schilfsaum des Schweriner Innensees nimmt der Anteil an Schilf innerhalb der Bestände zu. Die Verbuschung/Bewaldung nimmt landseitig bis hin zu geschlossenen Sumpfschilf-Erlenbruchwald und Aschweidengebüschen zu. Diese Bestände unterscheiden sich durch ihr Alter und Habitus deutlich von dem weiter landeinwärts stockendem Erlenbruchwald (Biotop 0504-222-4015). Bei weiterer Ausbreitung der konkurrenzkräftigen Arten ist ein Rückgang der seltenen Pflanzenarten zu erwarten. Neben der fortschreitenden Sukzession werden die Bestände durch Trampelpfade sowie mehrere größere Wildschweinnester gefährdet (Aufhäufung von Binsen und Grasstreu).																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☒ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☒ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum								vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge ☒ Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																												
Gefährdung Verbuschung, Verdrängung der seltenen, im Bestand gefährdeten Pflanzenarten durch konkurrenzkräftige Ubiquisten, Störung der Vegetation durch Schwarzwild (Foto)																																																				
														keine Gefährdung ☐																																						
Empfehlung																																																				
Z M W Z M K																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 4 - 2 2 2 - 4 0 2 1

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐		eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐	g	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

Nutzungsart

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐	g	forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐	k	Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐	g	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐	g	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex acutiformis Salix cinerea

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alnus glutinosa Calamagrostis canescens Eupatorium cannabinum Juncus subnodulosus
Lysimachia vulgaris Molinia caerulea Phragmites australis Carex appropinquata

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex paniculata Carex pseudocyperus Carex riparia Cirsium palustre
Epilobium palustre Equisetum palustre Galium palustre Galium uliginosum
Glecoma hederacea Hypericum tetrapterum Juncus effusus Lythrum salicaria
Peucedanum palustre Phalaris arundinacea Potentilla palustris Solanum dulcamara
Thelypteris palustris Valeriana dioica

Angaben zur Fauna
hohe Moorfroschpopulation, zahlreiche Ringelnatter in den Offenbereichen ; weiteres Foto: 230-02-20

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 10.08.2000
	Datum letzte Begehung: 11.08.2000
Bearbeiter/in: Mordhorst-Mordhorst	Foto: 1 Folgeseiten: 0