Biotopname Baufeld 1/2, Silbergrasflur O Feldgehölz		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										X																												TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>4</td></tr> </table>		0	5	0	4	2	4	1	4	0	5	4	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					
		X																																																								
0	5	0	4																																																							
2	4	1																																																								
4	0	5	4																																																							
Standort /Geologie Endmoränensand, Aufschüttung				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>3</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table>			3	3	0	2	6	7	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>5</td></tr> </table>						0	2	6	5																						
	3	3																																																								
0	2	6	7																																																							
0	2	6	5																																																							
Naturraum Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet 5 0 0				Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					0																																																	
			0																																																							
Landkreis / Kreisfreie Stadt Kreisfreie Stadt		Gemeinde / Stadt Schwerin, Landeshauptstadt																																																								
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01076				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																						
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																										
		Hauptcod.		Nebencode																																																						
		Code T P S		T M D																																																						
		% 9 0		1 0																																																						
Vegetationseinheiten artenarme Silbergrasflur, Rotstraußgrasflur																																																										
Habitats + Strukturen		D G S		D G O																																																						
Beschreibung / Besonderheiten Kleine, ca. 500 m ² große Silbergrasflur am westlichen Rand des ehemaligen Truppenübungsplatzes Sternbuchholz im Bereich einer ehemaligen Panzertrasse/Freihaltungstrasse. Möglicherweise beim Bau des Fährweges entstanden. Nach der Vegetationskartierung (MORDHORST 1991) waren bereits damals in diesem Bereich Trockenrasen/Silbergrasfluren anzutreffen. Die Vegetation wird fast ausschließlich aus Silbergras aufgebaut, die Deckung der Vegetation beträgt ca. 50 %, die Deckung der übrigen Arten beträgt zusammen unter 5 %. Die Fläche ist eingebettet in eine ruderalisierte Rotstraußgras-Queckenflur in der Silbergras nur untergeordnet auftritt. Randlich ist ein Teil des Übergangsbereiches zu der trockenen Ruderalflur als ruderalisierter Sandmagerrasen mit einbezogen. Floristisch bedeutsam ist der Bestand an Kleinem Filzkraut. Mit zunehmendem Alter der Silbergrasfluren ist mittel- bis langfristig die Ausbreitung von Trockenrasen (z. B. Rot-Straußgras, Schafschwingel) oder auch Kriechrasen bzw. Ruderalfluren (z. B. Quecke oder Beifuß) zu erwarten.																																																										
Wertbestimmende Kriterien																																																										
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum		☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																								
Gefährdung Ruderalisierung																																																										
				keine Gefährdung ☐																																																						
Empfehlung Schaffen von Rohboden																																																										

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 4 - 2 4 1 - 4 0 5 4

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☒	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	
☐	☒	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☒	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☒	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☒	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☒	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☒	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Corynephorus canescens

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Agrostis capillaris	Artemisia vulgaris	Conyza canadensis	Echium vulgare
Festuca rubra	<u>Filago minima</u>	Herniaria glabra	Hieracium pilosella
Medicago lupulina	Pinus sylvestris	Polytrichum piliferum	Quercus robur
Rumex acetosella	Sarothamnus scoparius	Tanacetum vulgare	Trifolium campestre
Plantago lanceolata	Elytrigia repens		

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 05.09.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Mordhorst-Mordhorst

Foto: 1

Folgeseiten: 0