Biotopname Feuchtbiotop "Dreschensaal" sw der "Buertannen"		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																													TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table>		0	5	0	6	1	1	3	4	0	0	8
	X																																																			
0	5	0	6																																																	
1	1	3																																																		
4	0	0	8																																																	
Standort /Geologie degradiertes Kesselmoor/Übergang Sander-Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																
Naturraum Krakower Seen- und Sandergebiet 4 1 1				Film-Nr. 1 8 6 - 0 3 8 1 Bild-Nr. 1 5 9 9																																																
Landkreis / Kreisfreie Stadt Parchim		Gemeinde / Stadt Dobbertin		Luftbild-Nr.																																																
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 11029				Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> Länge in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> min. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> max. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					1																																											
			1																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☒ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☒ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																														
Code V G S		V G R		V W N		M S P		V H F		V H D		R H K		S K T		V G B																																				
%		3 6		3 0		1 5		6		5		3		2		2		1																																		
Vegetationseinheiten rohrglanzgrasreiches Sumpfreitgras-Ried, Sumpfschilf-Ried, Steifseggen-Grauweiden-Gebüsch, Sumpfreitgras-Fadenseggen-Gilbweiderich-Hochstaudenflur, rohrglanzgrasreiche Gilbweiderich-Sumpfkraatzdistel-Hochstaudenflur,																																																				
Habitate + Strukturen D H M																																																				
Beschreibung / Besonderheiten weitere Veg.-einheiten: ----- Ackerkraatzdistel-Brennnessel-Hochstaudenflur, Landreitgras-Kriechrasen, Steifseggen-Bultried In einer lang gestreckten Ackersenke hat sich nach Entwässerung aus dem hier wahrscheinlich einst entwickelten Kesselmoor ein Feuchtbiotopkomplex aus Rieden, Hochstaudenfluren und Feuchtgebüsch entwickelt. Es dominiert heute ein rohrglanzgrasreiches Sumpfreitgras-Ried, das im Zentrum und im Norden in Sumpfschilf-Riede übergeht. Diese sind mit feuchten Hochstaudenfluren aus Sumpfkraatzdistel, Sumpfreitgras und Gilbweiderich verzahnt. Kleinflächig ausgebildet befinden sich auch hochstaudenreiche Degradierungsstadien mesotroph-saurer Moore im Nordteil des Biotopes. Es handelt sich dabei vor allem um sumpfreitgrasreiche Fadenseggen-Gilbweiderich-Hochstaudenfluren. Im Südtel liegt ein Steifseggen-Grauweiden-Gebüsch, das mit kleinen Steifseggen-Rieden verzahnt ist. Ebenfalls im Süden gelegen, gehört ein temporäres Kleingewässer mit zum Biotop. Gestörte Hochstaudenfluren (Ackerkraatzdistel-Brennnessel-Hochstaudenfluren) und Landreitgras-Kriechrasen haben sich vor allem an den Biotoprändern entwickelt.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum									☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																											
Gefährdung																																																				
																	keine Gefährdung ☒																																			
Empfehlung																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 6 - 1 1 3 - 4 0 0 8

Substrat

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	g	Torf, degradiert
☐	☐	k	Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie

☐	☐	k	dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐	k	mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe

☐	☐	k	trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐	k	frisch
☐	☐	g	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	k	intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

☐	☐	k	Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	k	
☐	☐	g	Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	g	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

☐	☐	k	Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	k	Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Calamagrostis canescens *Carex acutiformis*

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Calamagrostis epigejos *Carex elata* *Carex lasiocarpa* *Cirsium palustre*
Lycopus europaeus *Lysimachia vulgaris* *Phalaris arundinacea* *Salix cinerea*
Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex nigra *Carex riparia* *Cirsium arvense* *Deschampsia cespitosa*
Epilobium palustre *Galium palustre* *Glyceria fluitans* ***Iris pseudacorus***
Juncus effusus *Lysimachia thyrsoiflora* *Lythrum salicaria* *Polygonum amphibium*
Potentilla palustris *Ranunculus repens* *Solanum dulcamara* *Stellaria graminea*

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 04.12.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Weinauge

Foto: 2

Folgeseiten: 0