**Biotopname**
Feuchtwiesenbrache südwestlich Goldberger See

**Standort /Geologie**
vermoor. Verlandungsb. zw. Goldberger und Großem Medower See

X
X

**TK10** 0506 - 114 **Biotop-Nr.** - 4039

**Anschluß in TK** 0506 - 132

**Naturraum** Krakower Seen- und Sandergebiet
411

| | **Film-Nr.** | **Bild-Nr.** |
|---|---|---|
| Luftbild-Nr. | 138 | 0400 |

| | |
|---|---|
| Größe in ha | 0,1197 |
| Länge in m | , |
| min. Breite in m | , |
| max. Breite in m | , |

**Landkreis / Kreisfreie Stadt**
Parchim

**Gemeinde / Stadt**
Goldberg, Stadt

**lfd. Nr. im Biotopverzeichnis**
11137

**Schutzmerkmale**
geschützt nach §20 LNatG M-V [X]

1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLP | | FND | | NP | | FiB | |
| NSG | | LSG | | BR | | FFH-Geb. | |
| ND | | GLB | | FnB | | Wald-Totalreservat | |

| | **Hauptcod.** | **Nebencode** | | | | | | | **Überlagerungscode** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VRL | VGS | GFR | GFD | FGN | | | | | |
| % | 45 | 25 | 20 | 9 | 1 | | | | | |

**Vegetationseinheiten**
Land-Schilfröhricht, Sumpfreitgrasried, Kohldistelwiese, Rohrglanzgraswiese

**Habitate + Strukturen**

**Beschreibung / Besonderheiten**
Die Feuchtwiesenbrache liegt im Verlandungsbereich zwischen Goldberger und Großem Medower See auf torfigem Boden. Die Fläche wird am nördlichen Rand (der Straßenböschung vorgelagert) und am westlichen Rand von Entwässerungsgräben begrenzt. Der östliche Bereich ist brachgefallen und wird von einem Landschilfröhricht mit Weidenverbuschung bzw. einem Sumpfreitgrasried eingenommen. Zur südlich angrenzenden Wiese finden sich Bereiche mit Rohrglanzgras und Landreitgras. Der westliche Bereich wird als Mähweide genutzt. Hier findet sich eine Kohldistelwiese u. a. mit der Zweizeiligen Segge. Die Grasnarbe ist jedoch durch die Beweidung z. T. stark gestört.

**Wertbestimmende Kriterien**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Artenreichtum (Flora) | | vielfältige Standortverhältnisse |
| | Vorkommen seltener / typischer Tierarten | | historische Nutzungsformen |
| | seltener / gefährdeter Pflanzenbestand | | aktuelle Nutzung |
| | seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | | Flächengröße / Länge |
| | natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | | Umgebung relativ störungsarm |
| | gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | | landschaftsprägender Charakter |
| | typische Zonierung von Biotoptypen | | Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion |
| | Struktur- und Habitatreichtum | | |

**Gefährdung**

YLW YLS

keine Gefährdung [ ]

**Empfehlung**

ZMM

(c) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Str. 12, 12873 Güstrow, Tel. (03834) 777 - 0

## STANDORTMERKMALE ( k - kleinflächig, g - großflächig )

**TK10** 0506 - 114 - **Biotop-Nr.** 4039

**Substrat**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Torf, wenig gestört |
| | g | Torf, degradiert |
| | g | Antorf |
| | | Sand |
| | | Kies / Steine |
| | | Lehm |
| | | Ton |
| | | Halbkalk / Kalk |
| | | Schlamm / Faulschlamm |
| k | | gestörter Boden |

**Trophie**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | dystroph |
| | | oligotroph |
| | | mesotroph |
| | g | eutroph |
| | | poly- / hypertroph |

**Wasserstufe**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | trocken |
| | | mäßig trocken |
| | | wechselfeucht |
| k | | frisch |
| | | feucht |
| | g | sehr feucht |
| | g | naß |
| k | | offenes Wasser |
| | | quellig |

**Relief**

| k | g | |
|---|---|---|
| | g | eben |
| | | wellig |
| | | kuppig |
| | | dünig |
| | | Berg / Rücken |
| | | Riedel |
| | | Flachhang <= 9° |
| | | Steilhang > 9° |
| | | Nische |
| | | Senke / Strecksenke |
| | | Kerbtal |
| | | Sohlental |

**Exposition**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | N |
| | | NO |
| | | O |
| | | SO |
| | | S |
| | | SW |
| | | W |
| | | NW |

## NUTZUNGSMERKMALE ( k - kleinflächig, g - großflächig )

**Nutzungsintensität**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | intensiv |
| k | | extensiv |
| | g | aufgelassen |
| | | keine Nutzung |

**Nutzungsart**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker |
| | g | Wiese |
| k | | Weide |
| | | forstliche Nutzung |

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Fischerei |
| | | Angeln |
| | | Erholung |
| | | Kleingartenbau |
| | | Erwerbsgartenbau |
| | | Ferienhäuser |
| | | Bodenentnahme |
| | | Verkehr |
| | | Ver- / Entsorgungsanlage |
| | | sonstige Nutzung: |

**Umgebung**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker / Gartenbau |
| | | Ackerbrache |
| | | Grünland. intensiv |
| | g | Grünland, extensiv |
| | | Laub- / Mischwald |
| | | Nadelwald |
| | | Feuchtwald / -gebüsch |
| | | Gehölz |
| | | Röhricht / Feuchtbrache |
| | | Hochstauden / Ruderalflur |
| k | | Graben |

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Fließgewässer |
| | | Stillgewässer |
| | | Trockenbiotop |
| | | Grünanlage / Kleingarten |
| | | Weg |
| | g | Straße, Parkplatz |
| | | Bahnanlage |
| | | Gewerbe / Industrie |
| | | Silo / Stallanlage |
| | | Gebäude / Siedlung |
| | | Spülfeld / Halde |
| | | Bodenentnahme |

Pflanzenarten dominant ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Calamagrostis canescens, Phragmites australis

Pflanzenarten ±zahlreich ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Holcus lanatus, Phalaris arundinacea

Pflanzenarten vereinzelt ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Calamagrostis epigejos
Carex gracilis
Equisetum palustre
Glyceria maxima
Lotus uliginosus
Potentilla reptans
Caltha palustris
Cirsium arvense
Filipendula ulmaria
**Iris pseudacorus**
Lysimachia vulgaris
Ranunculus repens
Carex acutiformis
Cirsium oleraceum
Galium palustre
Juncus articulatus
Lythrum salicaria
Salix cinerea
Carex disticha
Deschampsia cespitosa
Glecoma hederacea
Juncus inflexus
Plantago major

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 17.11.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Walter

Foto: 1 Folgeseiten: 0

(c) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Str. 12, 12873 Güstrow, Tel. (03834) 777 - 0