Biotopname Niedermoorbereich im "Birkenbruch" nördlich Werder		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															X																							TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table>		0	5	0	6	1	3	3	4	0	0	5	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table>		4	0	0	5
	X																																																									
0	5	0	6																																																							
1	3	3																																																								
4	0	0	5																																																							
4	0	0	5																																																							
Standort /Geologie vermoorte Eintiefung innerhalb der kuppigen Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Film-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>8</td></tr> </table>		1	3	8	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>		0	1	0	2																														
1	3	8																																																								
0	1	0	2																																																							
Naturraum Oberes Warnow-Elde-Gebiet 4 1 0				Luftbild-Nr.		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																														
Landkreis / Kreisfreie Stadt Parchim		Gemeinde / Stadt Werder		Größe in ha		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>					0	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>3</td></tr> </table>		7	7	7	3																																									
			0																																																							
7	7	7	3																																																							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 11875				min. Breite in m		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																														
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																								
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																																		
Code		M	S	P	M	S	T	G	F	F	B	F	X																																													
%			7	5		1	5			5			5																																													
Vegetationseinheiten Sumpfreitgras-Staudenflur mit Arten der Zwischenmoore, Flatterbinsen-Staudenflur, torfmoosfreies Schnabelseggen-Wollgrasried, Flutschwaden-Knickfuchsschwanz-Flutrasen, Zitterpappel-Gehölz																																																										
Habitats + Strukturen D G B																																																										
Beschreibung / Besonderheiten Das wohl infolge von Entwässerung degenerierte mesotrophe Sauer-Zwischenmoor liegt in einer als Weide genutzten kuppigen Grundmoränenlandschaft. Der Bereich ist abgezaunt und durch eine mit Gehölzen und eutrophen Hochstaudenflur bestandenen Böschung deutlich von seiner Umgebung abgegrenzt. Die Pflanzendecke wird von Flatterbinse und mit geringerem Anteil von Sumpfreitgras beherrscht. Ihnen gesellen sich Arten der feuchten Staudenfluren und Röhrichte wie Wolfstrapp, Bittersüßer Nachtschatten, Sumpf-Helmkraut und Rohrglanzgras zu. Dazwischen liegen kleinere Bereiche, die von Flussschwaden und Knickfuchsschwanz geprägt werden. Im südlichen Bereich der Eintiefung prägen die für die Moore mesotropher-saurer Standorte typischen Wollgras und Schnabelsegge den Aspekt. Torfmoose fehlen ganz. In der Mitte des Gebietes befindet sich ein von Zitterpappeln umgebener Hochstand.																																																										
Wertbestimmende Kriterien																																																										
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum											☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																															
Gefährdung																																																										
Y W G																		keine Gefährdung ☐																																								
Empfehlung																																																										

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 6 - 1 3 3 - 4 0 0 5

Substrat

k	g	
		Torf, wenig gestört
	g	Torf, degradiert
k		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
	g	mesotroph
		eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
k		frisch
k		feucht
	g	sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
		Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohlental

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
		aufgelassen
	g	keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
	g	Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
	g	Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Juncus effusus

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Agrostis canina **Calamagrostis canescens** **Carex rostrata** **Eriophorum angustifolium**
 Oenanthe aquatica

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alisma plantago-aquatica **Alopecurus geniculatus** **Calamagrostis epigejos** **Carex acutiformis**
Carex gracilis **Carex pseudocyperus** **Galium palustre** **Glyceria fluitans**
Holcus lanatus **Lycopus europaeus** **Lysimachia vulgaris** **Lythrum salicaria**
Molinia caerulea **Myosotis palustris** **Phalaris arundinacea** **Polygonum amphibium**
Populus tremula **Ranunculus sceleratus** **Rorippa amphibia** **Salix fragilis**
Scutellaria galericulata **Solanum dulcamara** **Sparganium erectum** **Stellaria palustris**
Typha latifolia

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 23.06.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Walter

Foto: 3

Folgeseiten: 0