

<b>Biotopname</b> Kleiner Bruch in nördlicher Verlandungsbucht des Dreiersee		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															X																							<b>TK10</b> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr> </table>		0	5	0	6	2	3	2	4	0	1	7
	X																																																			
0	5	0	6																																																	
2	3	2																																																		
4	0	1	7																																																	
<b>Standort /Geologie</b> Verlandungsmoor		<b>Anschluß in TK</b> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
<b>Naturraum</b> Großseenland mit Müritz-, Kölpin- und Fleesensee		<b>Film-Nr.</b> Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>7</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table>			7	6	0	3	1	4																																										
	7	6																																																		
0	3	1	4																																																	
<table border="1"> <tr><td>4</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>		4	1	2	<b>Bild-Nr.</b> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>						1	2	0	1																																						
4	1	2																																																		
1	2	0	1																																																	
<b>Landkreis / Kreisfreie Stadt</b> Müritz		<b>Gemeinde / Stadt</b> Alt Schwerin																																																		
<b>lfd. Nr. im Biotopverzeichnis</b> 00655		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NP <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> FiB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NSG <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> LSG <table border="1"><tr><td></td></tr></table> BR <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FFH-Geb. <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> ND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> GLB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FnB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Wald-Totalreservat <table border="1"><tr><td></td></tr></table>				1		1			1																																									
1																																																				
1																																																				
1																																																				
<b>Schutzmerkmale</b> geschützt nach §20 LNatG M-V <input checked="" type="checkbox"/>																																																				
<b>Hauptcod.</b>		<b>Nebencode</b>																																																		
Code W F R		W F A W N R																																																		
% 4 5		3 5 2 0																																																		
<b>Vegetationseinheiten</b> Pfeifengras-Erlen-Bruchwald, Sumpfreitgras-Erlenwald, Pfeifengras-Sumpfreitgras-Birken-Bruchwald, Steifseggen-Erlenbruchwald, Sumpffarn-Erlen-Bruchwald																																																				
<b>Habitats + Strukturen</b>		H D K H S E H Z I H M S H A J H T A H T B H X B																																																		
<b>Beschreibung / Besonderheiten</b> Kleiner Bruch in der nördlichen Verlandungsbucht des Dreiersee. Auf feuchtem bis sehr feuchtem Standort, der vor 200 Jahren noch völlig mit Wasser bedeckt war, stockt mitten im Schilf-Landröhricht ein Erlen-Birken-Bruch. Es dominiert Schwarzerle, die im westlichen Biotopbereich von Moorbirke umgeben ist. Vorherrschend ist ein Pfeifengras-Erlen-Bruchwald (1) mit ausgeprägter Bult-Schlenken-Struktur im östlichen Biotopbereich. Das Biotop ist nahezu strauchfrei, die Krautschicht mit Sumpffarn, Gilbweiderich, Pfeifengras und Steifsegge bruchwaldtypisch. Im Bereich der Moorbirken wachsen Torfmoose und Wassernabel. Aktuell ist das Biotop, Bestandteil eines großen NSG, nicht gefährdet.  (1) SCHUHMANN und HEMPRICH(1996) sprechen auf Grund der Kleinheit des Biotops von einem nicht typisch entwickelten Torfmoos-Moorbirkenwald.																																																				
<b>Wertbestimmende Kriterien</b>																																																				
<input type="checkbox"/> Artenreichtum (Flora) <input type="checkbox"/> Vorkommen seltener / typischer Tierarten <input type="checkbox"/> seltener / gefährdeter Pflanzenbestand <input type="checkbox"/> seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft <input checked="" type="checkbox"/> natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops <input type="checkbox"/> gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops <input type="checkbox"/> typische Zonierung von Biotoptypen <input type="checkbox"/> Struktur- und Habitatreichtum		vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge <input checked="" type="checkbox"/> Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																		
<b>Gefährdung</b>																																																				
		keine Gefährdung <input checked="" type="checkbox"/>																																																		
<b>Empfehlung</b>																																																				

