Biotopname Bruchwaldkomplex 1,4 km SSW Tarnow		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X	X																				TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> </table>		0	5	0	7	2	2	4	4	0	0	9	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> </table>		4	0	0	9
			X	X																																																						
0	5	0	7																																																							
2	2	4																																																								
4	0	0	9																																																							
4	0	0	9																																																							
Standort / Geologie Senke/Verlandungsmoor/kuppige Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr> </table>		0	5	0	8	1	1	3																																														
0	5	0	8																																																							
1	1	3																																																								
Naturraum Kuppiges Tollensegebiet mit Werder 3 2 0				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>8</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			8	6	0	4	1	0	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table>		1	2	6	6																																								
	8	6																																																								
0	4	1	0																																																							
1	2	6	6																																																							
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin		Gemeinde / Stadt Rosenow		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr> </table> ,					9																																																	
			9																																																							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 18333				min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ,																																																						
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																								
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																																		
Code		W	N	R	W	N	E	W	F	R	V	H	F	V	G	S	V	W	N	U	M	V																																				
%			4	8		3	3			8			7			2			2																																							
Vegetationseinheiten Großseggen-Erlenbruchwald, Großseggen-Erlen-Eschenwald, Winkelseggen-Erlen-Eschenwald, Sumpfreitgras-Erlenbruchwald, Rasenschmielen-Erlenbruchwald, Brennessel-Sumpfreitgras-Hochstaudenflur, Rauhaarweidenröschen-Hochstaudenflur, Sumpfreitgrasried,																																																										
Habitate + Strukturen <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>H</td><td>M</td> <td>H</td><td>D</td><td>K</td> <td>H</td><td>D</td><td>L</td> <td>H</td><td>Z</td><td>R</td> <td>H</td><td>T</td><td>A</td> <td>H</td><td>T</td><td>B</td> <td>H</td><td>A</td><td>O</td> <td>H</td><td>N</td><td>N</td> </tr> </table>																							D	H	M	H	D	K	H	D	L	H	Z	R	H	T	A	H	T	B	H	A	O	H	N	N												
D	H	M	H	D	K	H	D	L	H	Z	R	H	T	A	H	T	B	H	A	O	H	N	N																																			
Beschreibung / Besonderheiten weitere Veg.-einheiten: Erlen-Grauweidengebüsch Bruchwaldkomplex auf meliorativ beeinträchtigtem Verlandungsmoor in Senke innerhalb der bewaldeten, kuppigen Grundmoräne von Laubmisch- und Nadelwald sowie kleinflächig ruderalen Staudenfluren umgeben. Auf sehr feuchten bis nassen, schwach bis mäßig degradierten Torfen und Antorf stockt ein z. T. lichter, mittelalter Großseggen-Erlenbruchwald nasser Moor- und Sumpfstandorte, der zum Rand hin in den Erlen-Eschenwald nasser Standorte in der Ausbildung als Großseggen-Erlen-Eschenwald bzw. Winkelseggen-Erlen-Eschenwald sowie kleinflächig in den Erlenbruchwald feuchter Moor- und Sumpfstandorte als Sumpfreitgras-Erlenbruchwald bzw. Rasenschmielen-Erlenbruchwald übergeht. Eine ehemalige Niederwaldnutzung der Erle ist zu erkennen. Das teilweise erfolgte Absterben von Erlen und Eschen deutet auf stärkere Wasserspiegelschwankungen hin. In diesen Bereichen hat sich eine Hochstaudenflur eutropher Moor- und Sumpfstandorte in der Ausbildung als Brennessel-Sumpfreitgras-Hochstaudenflur bzw. Rauhaarweidenröschen-Hochstaudenflur z. T. mit eingestreutem Sumpfreitgrasried entwickelt. Kleinflächig wurde daneben auch das Erlen-Grauweidengebüsch angetroffen. Aus floristischer Sicht ist neben dem vereinzelt Auftreten des Sumpfpippaus auch das Vorkommen des Großseggen-Erlen-Eschenwaldes als gefährdete Pflanzengesellschaft hervorzuheben.																																																										
Wertbestimmende Kriterien																																																										
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☒ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum											☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																															
Gefährdung																																																										
Y W G																					keine Gefährdung ☐																																					
Empfehlung																																																										
Z S E																																																										

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 7 - 2 2 4 - 4 0 0 9

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

Nutzungsart

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Alnus glutinosa Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Alnus incana	Betula pubescens	Calamagrostis canescens	Calliergonella cuspidata
Carex elata	Carex riparia	Cirsium palustre	Deschampsia cespitosa
Epilobium hirsutum	Fraxinus excelsior	Geum rivale	Glyceria fluitans
Lycopus europaeus	Lysimachia vulgaris	Mentha aquatica	Rubus idaeus
Salix cinerea	Solanum dulcamara	Thelypteris palustris	Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex elongata	Carex remota	Chrysosplenium alternifolium	Circaea lutetiana
Cirsium arvense	Cirsium oleraceum	<u>Crepis paludosa</u>	Dryopteris carthusiana
Eupatorium cannabinum	Frangula alnus	Galium palustre	Humulus lupulus
Iris pseudacorus	Juncus effusus	Lythrum salicaria	Phalaris arundinacea
Phragmites australis	Quercus robur	Rubus caesius	Scutellaria galericulata

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 13.10.2003

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Teppke

Foto: 2

Folgeseiten: 0