Biotopname Feuchtsenke nördlich von Userin nahe des Sees		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														X													TK10 0 5 0 7 - 4 4 4 - 4 0 0 9		Biotop-Nr.	
		X																														
Standort /Geologie Senke in welliger, sandiger Grundmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																
Naturraum Neustrelitzer Kleinseenland 4 2 0				Film-Nr. Luftbild-Nr. 1 4 3 - 0 7 7 4		Bild-Nr.																										
Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz		Gemeinde / Stadt Userin		Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>						0	0 8 5 4																					
				0																												
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01262				Länge in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG 1 BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																														
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																										
Code V R L W N W																																
%		6 0		4 0																												
Vegetationseinheiten Grauweiden-Silberweidensumpfwald, Landreitgras-Schilfröhricht																																
Habitats + Strukturen		H T L H T B																														
Beschreibung / Besonderheiten Die feuchte, von Schilf dominierte Senke liegt innerhalb der sandigen Grundmoräne nördlich von Userin. Im Zentrum des Schilfröhrichts befindet sich ein von Grauweiden durchsetztes Silberweidengehölz. Heruntergebrochene Äste der Silber-Weiden sorgen für einen relativ hohen Totholzanteil. Der von Ost nach West durch das Biotop verlaufende Graben führt Wasser, hier tritt vereinzelt Wasserfeder auf. Begleitende Art des Schilfröhrichts ist das Land-Reitgras dessen Stetigkeit nach außen zunimmt.																																
Wertbestimmende Kriterien																																
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum				☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																												
Gefährdung																																
Y W E						keine Gefährdung ☐																										
Empfehlung																																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 7 - 4 4 4 - 4 0 0 9

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☒	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☒	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☒	feucht
☒	☐	sehr feucht
☒	☐	naß
☒	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☒	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☒	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☒	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☒	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	Acker
☐	☒	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant
Salix alba

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Calamagrostis epigejos

Phragmites australis

Humulus lupulus

Pflanzenarten ±zahlreich
Rubus fruticosus
Galium palustre

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Salix cinerea
Aegopodium podagraria

Deschampsia cespitosa

Geum urbanum

Pflanzenarten vereinzelt
Crataegus monogyna
Calamagrostis canescens
Ribes rubrum

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Populus tremula
Juncus effusus
Sonchus palustris

Quercus robur
Anthriscus sylvestris
Hottonia palustris

Sambucus nigra
Carex acutiformis
Euonymus europaeus

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 14.12.2006

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: plan4-Hundt

Foto: 2

Folgeseiten: 0