Biotopname naturnaher Bach mit Moorkomplex ca. 0,7 km westl. Gatscheck		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															X																							TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>		0	5	0	8	1	4	4	4	0	0	2	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					
	X																																																									
0	5	0	8																																																							
1	4	4																																																								
4	0	0	2																																																							
Standort /Geologie vermoorte glaz. Abflußrinne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Film-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>8</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>5</td></tr> </table>			8	6	0	0	7	5	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td>1</td><td>3</td></tr> </table>						2	8	1	3																						
	8	6																																																								
0	0	7	5																																																							
2	8	1	3																																																							
Naturraum Kuppiges Tollensegebiet mit Werder 3 2 0		Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz		Gemeinde / Stadt Wulkenzin		lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01910		Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG 1 BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																																		
Code		F	B	N	W	F	R	V	W	N	V	G	R	V	Q	R	V	W	D	W	F	D	F	Q	S	V	H	F	U	F	G	U	M	Q																								
%				9			3			1			3			0			8			8			5			4			3			2																								
Vegetationseinheiten Rasenschmielen-Sumpfsseggen-Erlenbruchwald, Giersch-Sumpfsseggen-Erlenbruchwald, Bingelkraut-Sumpfsseggen-Erlenbruchwald, Sumpfsseggen-Grauweidengebüsch, Sumpfsseggenried, Sumpfsseggen-Schilf - Quellröhricht, Brennessel-Rispenseggen-Quellstaudenflur																																																										
Habitats + Strukturen		D	H	M	C	L	G	C	L	K	C	Q	N	C	W	F	C	G	L	H	D	K	H	D	S	H	S	E																														
H ₁ S ₁ O		H ₁ Z ₁ R	H ₁ Z ₁ I	H ₁ M ₁ S	H ₁ A ₁ J	H ₁ A ₁ O																																																				
Beschreibung / Besonderheiten zu Vegetationseinheiten: Brennessel-Grauweidengebüsch, Himbeer-Erlengehölz, Brennessel-Sumpfsseggen-Hochstaudenflur, Himbeer-Brennessel-Sumpfsseggen-Hochstaudenflur Vegetationseinheiten und Biotoptypen > 1%: Sumpfsseggen-Erlenbruchwald (WNR), Brunnenkressen-Quellflur (VQF), Waldmeister-Buchenwald (WBM) Schmaler Bach mit Moorniederung entlang des Großen Moorbaches im Brodaer Holz. Früher zumindest in Teilen begradigt. Infolge der Auffassung wieder naturnah. Oberhalb und unterhalb des Biotopes wurde der Bach wahrscheinlich verrohrt. Hier ist heute noch eine flache, trockene Rinne sichtbar. Entlang des Baches zahlreiche Sickerstellen, die teils vegetationslos und von Schweinen zerwühlt sind oder stellenweise von Brunnenkressenfluren, Kriechendem Hahnenfuß und Bachbunge bestanden sind. Im südwestlichen Teil des Biotopes befindet sich in leichter Hanglage oberhalb des Baches eine ausgedehnte, vegetationslose Sickerquellfläche im Buchenwald. Oberhalb des Biotopes zieht sich hier ein alter schmaler Fanggraben entlang, der jedoch kein Wasser mehr sammelt. Die Vegetation der vermoorten Niederung stellt einen Komplex aus Erlenbruchwald, Grauweidengebüsch, Quellröhricht und Sumpfsseggenried dar. Die Standorte sind feucht bis sehr feucht. An weniger feuchten Standorten, vor allem randlich, treten Himbeere und Brennessel hinzu, im Wald z.T. Buschwindröschen und Bingelkraut. Im Süden wird der kaum fließende Quellbach zum mäßig fließenden schmalen Bach mit Erlen an den Rändern. Hier ist keine Moorniederung ausgebildet. Beeinträchtigung des Biotopes durch randliche Fahrspuren von Forstfahrzeugen und Deponierung von Baumschnitt auf den Moorflächen. Vegetationseinheiten: Himbeer-Erlengehölz, Schilf-Brennessel-Grauweidengebüsch, Brennessel-Sumpfsseggen-Hochstaudenflur, Himbeer-Brennessel-Sumpfsseggen-Hochstaudenflur, Sumpfsseggen-Schilf-Erlenbruchwald, Erlen-Ufergehölz, Brunnenkressen-Quellflur, Waldmeister-Buchenwald																																																										
Wertbestimmende Kriterien																																																										
☐ Artenreichtum (Flora)		X		vielfältige Standortverhältnisse																																																						
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten				historische Nutzungsformen																																																						
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				aktuelle Nutzung																																																						
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				Flächengröße / Länge																																																						
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		X		Umgebung relativ störungsarm																																																						
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				landschaftsprägender Charakter																																																						
☐ typische Zonierung von Biotoptypen		X		Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																						
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																																										
Gefährdung																																																										
Y ₁ W ₁ S ₁		Y ₁ S ₁ I ₁		Y ₁ F ₁ F ₁																										keine Gefährdung																												
Empfehlung																																																										
Z ₁ S ₁ R ₁																																																										

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 8 - 1 4 4 - 4 0 0 2

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	g	Torf, degradiert
☐	☐	k	Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	g	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐	g	quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐	k	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐	g	Laub- / Mischwald
☐	☐	k	Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	k	Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Alnus glutinosa
Phragmites australis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Rubus idaeus

Salix cinerea

Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich
Alnus incana
Dryopteris carthusiana
Veronica beccabunga

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Aegopodium podagraria
Galium aparine

Calamagrostis canescens
Ranunculus ficaria

Deschampsia cespitosa
Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt
Betula pendula
Lonicera periclymenum
Angelica sylvestris
Geum rivale
Scirpus sylvaticus

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Corylus avellana
Salix fragilis
Calamagrostis epigejos
Mercurialis perennis
Scrophularia umbrosa

Crataegus monogyna
Anemone nemorosa
Carex panicea
Pulmonaria officinalis
Nasturtium microphyllum

Humulus lupulus
Anemone ranunculoides
Filipendula ulmaria
Ranunculus repens

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 04.04.2002

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Suchodoletz

Foto: 8

Folgeseiten: 0