Biotopname Feuchtgrünland südöstlich von Pleetz		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 5 0 8 - 2 2 2 - 4 0 1 7		Biotop-Nr.	
			X																																		
Standort /Geologie Datzeniederung in Grundmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Anschluß in TK															
Naturraum Tollensebecken mit Tollense- und Datzetal		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Film-Nr.		Bild-Nr.													
3 2 1		Luftbild-Nr. 1 0 4 - 0 0 8 0 Größe in ha 5 Länge in m min. Breite in m max. Breite in m		4 7 4 9																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz				Gemeinde / Stadt Genzkow Datzetal																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 02717																																					
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																			
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																															
Code		V G R		V R R F G N																																	
%		6 0		3 8		2																															
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Ried, Rohrglanzgras-Röhricht																																					
Habitats + Strukturen		D H M																																			
Beschreibung / Besonderheiten - kleinflächiges Mosaik aus Rohrglanzgras-Röhricht und Sumpfschilf-Ried, südöstlich von Pleetz, innerhalb der Datzeniederung, auf Torf - Biotop wird durch angrenzende und Binnengräben entwässert - neben Dominanz von Rohrglanzgras und Sumpfschilf zahlreiches Vorkommen von Weißem Straußgras, Rispensegge, Beinwell, Wasserdarm sowie Schilf - Fläche wird zum Teil extensiv beweidet und grenzt großflächig an Gräben mit Hochstaudenflur sowie Extensivgrünland																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
☐ Artenreichtum (Flora)		☐ vielfältige Standortverhältnisse																																			
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten		☐ historische Nutzungsformen																																			
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		☒ aktuelle Nutzung																																			
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		☐ Flächengröße / Länge																																			
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		☒ Umgebung relativ störungsarm																																			
☒ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		☐ landschaftsprägender Charakter																																			
☐ typische Zonierung von Biotoptypen		☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																			
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung Entwässerung durch Randgraben / Grabensystem																																					
Y W S		Y W E				keine Gefährdung ☐																															
Empfehlung Entwässerung einschränken																																					
Z S E																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 8 - 2 2 2 - 4 0 1 7

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐	g	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐	g	Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐	g	Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐	g	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	g	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	g	Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Carex acutiformis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Phalaris arundinacea

Pflanzenarten ±zahlreich
Agrostis stolonifera
Symphytum officinale

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex paniculata

Myosoton aquaticum

Phragmites australis

Pflanzenarten vereinzelt
Carex appropinquata
Epilobium palustre
Juncus effusus
Myosotis palustris
Scrophularia umbrosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex riparia
Galium aparine
Lycopus europaeus
Oenanthe aquatica
Stachys palustris

Cirsium oleraceum
Glechoma hederacea
Lythrum salicaria
Ranunculus sceleratus
Urtica dioica

Cirsium palustre
Heracleum sphondylium
Mentha aquatica
Scrophularia nodosa
Valeriana officinalis

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 14.10.1996

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: StAUNNB-Kunicke

Foto: 1

Folgeseiten: 0