**Biotopname**
Ried-Gehölzkomplex 1,5km NÖstlich Weitendorf im Forst Feldberger Hütte

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **TK10** | | **Biotop-Nr.** |
|---|---|---|
| 0 5 0 8 - 4 4 3 | - | 4 0 2 0 |

**Anschluß in TK**
- 
- 
-

**Standort /Geologie**
Niedermoor in der welligen Grundmoräne

**Naturraum** Kuppiges Tollensegebiet mit Werder
3 2 0

| | **Film-Nr.** | | **Bild-Nr.** |
|---|---|---|---|
| Luftbild-Nr. | 7 9 | - | 0 2 2 4 |
| | | - | |
| Größe in ha | 0 | , | 1 8 2 8 |
| Länge in m | | , | |
| min. Breite in m | | , | |
| max. Breite in m | | , | |

**Landkreis / Kreisfreie Stadt**
Mecklenburg-Strelitz

**Gemeinde / Stadt**
Feldberger Seenlandschaft

**lfd. Nr. im Biotopverzeichnis**
11679

**Schutzmerkmale**
geschützt nach §20 LNatG M-V ☒

1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLP | | FND | | NP | 1 | FiB | |
| NSG | | LSG | | BR | | FFH-Geb. | 1 |
| ND | | GLB | | FnB | | Wald-Totalreservat | |

| | **Hauptcod.** | **Nebencode** | **Überlagerungscode** |
|---|---|---|---|
| Code | W N R | V G R | |
| % | 6 0 | 4 0 | |

**Vegetationseinheiten**
Seggen-Erlen-Bruchwald, Sumpfseggen-Ried

**Habitate + Strukturen** H Z R | H S E | H A O | H X W | H T B

**Beschreibung / Besonderheiten**
In der welligen Grundmoräne ca. 1,5 km nordöstlich Weitendorf befindet sich im Forst Feldberger Hütte in Muldenlage ein kleines Niedermoor. Es war an eine Graben angeschlossen.

Im Zentrum stockt ein nicht sehr großes Seggen-Erlen-Gehölz. Die Baumschicht ist relativ geschlossen. Einige Erlen sind aber umgefallen, wobei sich die Wurzelteller aufrecht gestellt haben. Die Artenzusammensetzung unterscheidet sich nur wenig von der des Sumpfseggen-Riedes, das das Gehölz ringförmig umschließt. .Allerdings findet man noch Reste von Torfmoosen. Im Ried kommt neben der Sumpf-Segge auch die Wald-Simse mit hohem Anteil vor.

Entlang des Außenrandes des Moores existiert ein schmaler Birken-Saum, dem sich der Buchen-Mischwald anschließt.

**Wertbestimmende Kriterien**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Artenreichtum (Flora) | ☐ | vielfältige Standortverhältnisse |
| ☐ | Vorkommen seltener / typischer Tierarten | ☐ | historische Nutzungsformen |
| ☐ | seltener / gefährdeter Pflanzenbestand | ☐ | aktuelle Nutzung |
| ☐ | seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | ☐ | Flächengröße / Länge |
| ☒ | natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | ☐ | Umgebung relativ störungsarm |
| ☐ | gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | ☐ | landschaftsprägender Charakter |
| ☐ | typische Zonierung von Biotoptypen | ☐ | Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion |
| ☐ | Struktur- und Habitatreichtum | ☐ | |

**Gefährdung**

keine Gefährdung ☒

**Empfehlung**
ohne

## STANDORTMERKMALE

( k - kleinflächig, g - großflächig )

**TK10** 0 5 0 8 - 4 4 3 - **Biotop-Nr.** 4 0 2 0

**Substrat**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Torf, wenig gestört |
| | g | Torf, degradiert |
| | | Antorf |
| | | Sand |
| | | Kies / Steine |
| | | Lehm |
| | | Ton |
| | | Halbkalk / Kalk |
| | | Schlamm / Faulschlamr |
| | | gestörter Boden |

**Trophie**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | dystroph |
| | | oligotroph |
| | | mesotroph |
| | g | eutroph |
| | | poly- / hypertroph |

**Wasserstufe**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | trocken |
| | | mäßig trocken |
| | | wechselfeucht |
| | | frisch |
| | g | feucht |
| k | | sehr feucht |
| | | naß |
| | | offenes Wasser |
| | | quellig |

**Relief**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | eben |
| | | wellig |
| | | kuppig |
| | | dünig |
| | | Berg / Rücken |
| | | Riedel |
| | | Flachhang <= 9° |
| | | Steilhang > 9° |
| | | Nische |
| | g | Senke / Strecksenke |
| | | Kerbtal |
| | | Sohlental |

**Exposition**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | N |
| | | NO |
| | | O |
| | | SO |
| | | S |
| | | SW |
| | | W |
| | | NW |

## NUTZUNGSMERKMALE

( k - kleinflächig, g - großflächig )

**Nutzungsintensität**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | intensiv |
| | | extensiv |
| | | aufgelassen |
| | g | keine Nutzung |

**Nutzungsart**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker |
| | | Wiese |
| | | Weide |
| | | forstliche Nutzung |

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Fischerei |
| | | Angeln |
| | | Erholung |
| | | Kleingartenbau |
| | | Erwerbsgartenbau |
| | | Ferienhäuser |
| | | Bodenentnahme |
| | | Verkehr |
| | | Ver- / Entsorgungsanlage |
| | | sonstige Nutzung: |

**Umgebung**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker / Gartenbau |
| | | Ackerbrache |
| | | Grünland. intensiv |
| | | Grünland, extensiv |
| | g | Laub- / Mischwald |
| | | Nadelwald |
| | | Feuchtwald / -gebüsch |
| | | Gehölz |
| | | Röhricht / Feuchtbrache |
| | | Hochstauden / Ruderalflur |
| | | Graben |

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Fließgewässer |
| | | Stillgewässer |
| | | Trockenbiotop |
| | | Grünanlage / Kleingarten |
| | | Weg |
| | | Straße, Parkplatz |
| | | Bahnanlage |
| | | Gewerbe / Industrie |
| | | Silo / Stallanlage |
| | | Gebäude / Siedlung |
| | | Spülfeld / Halde |
| | | Bodenentnahme |

Pflanzenarten dominant ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Alnus glutinosa
Carex acutiformis
Scirpus sylvaticus

Pflanzenarten ±zahlreich ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Agrostis stolonifera
Carex elata
Glyceria fluitans
Lysimachia vulgaris
Peucedanum palustre
Urtica dioica
Betula pubescens
Carex elongata
**Iris pseudacorus**
Lythrum salicaria
Rubus idaeus
Calamagrostis canescens
Equisetum palustre
Lemna minor
**Menyanthes trifoliata**
Solanum dulcamara
Callitriche spec.
Galium palustre
Lysimachia thyrsiflora
Myosotis palustris
Thelypteris palustris

Pflanzenarten vereinzelt ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 16.08.2006

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Voigtländer

Foto: 1

Folgeseiten: 0

(c) Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Str. 12, 12873 Güstrow, Tel. (03834) 777 - 0